Ideen
zur
Diagnostik

Beobachtenden Aerzten
mitgetheilet

von

Johann Ernst Wichmann,

d. A. D., Königl. Großbr. Leibmedicus, Mitgliede der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen, der Gesellschaft Naturforsch. Freunde zu Berlin, der Churmaynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt, und der schweizerischen Gesellsch. correspondirender Aerzte und Wundärzte zu Zürich ꝛc.

Dritter Theil.

Hannover,

in der Helwingschen Hofbuchhandlung. 1802.

Ideen
zur
DIAGNOSTIK

beobachtenden Aerzten
mitgetheilt
von

Johann Ernst Wichmann,
Königl. Leibmedicus zu Hannover, Mitgliede der königl. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen, der Gesellsch. naturforschender Freunde zu Berlin, der churmaynz. Akademie zu Erfurt, u. der schweizerischen Gesellsch. correspondir. Aerzte zu Zürich etc.

Dritter Band.

HANNOVER, 1802
im Verlage der Helwingschen Hofbuchhandl.

Vorrede.

Die Leser dürfen in diesem dritten Theile eben so wenig, als in den beyden vorhergehenden, etwas systematisches, oder eine vollständig zusammenhängende Geschichte der Krankheiten erwarten, welche ich untersuche. Ich liefere ihnen noch immer bloß fragmentarisch das Wesentliche, das Merkwürdigste in der Beschreibung derselben, so wie es zu meinem Plane gehört, und auf die Diagnostik eine Beziehung hat; das heißt: bloß um das genau genug kennen zu lernen, wodurch sie sich vor andern auszeichnen, und um sie alsdann auch von ähnlichen unterscheiden zu können, ohne daß ich das Aetiologische, Pathologische, Historische, oder gar Therapeutische bey dieser Untersuchung weiter berühre.

Bin ich hin und wieder diesem Vorsatze dennoch ungetreu geworden, und besonders in diesem dritten Theile von der

eigentlich diagnostischen Betrachtung zuweilen abgewichen, so geschahe es, weil ich glaubte, die Trockenheit, welche vielleicht bloß eine Vergleichung von Krankheiten mit sich führen könnte, dadurch zu verbessern, und das Gesagte etwas anziehender machen zu müssen. Es werden jedoch diese wenigen Ausschweifungen hoffentlich auch nicht ganz ohne Nutzen seyn, da sie vielmehr den ausdrücklichen Wunsch von einigen bisherigen Lesern befriedigen.

Die Idee zu einer Diagnostik, die, so viel ich weiß, vor mir Niemand gehabt, hat übrigens nun die Aufmerksamkeit von mehreren so sehr rege gemacht, daß sie seitdem bey Bearbeitung von Krankheiten nicht nur sehr sichtbar, weit mehr Rücksicht auf Diagnostik nehmen, und von der großen Nothwendigkeit derselben immer mehr überzeugt zu seyn scheinen, sondern man hält auch seitdem auf Universitäten Vorlesungen über die Diagnostik, und man schreibt Handbücher der Diagnostik.

Nach-

Nachdem ich so glücklich gewesen bin, diese Absicht zu erreichen, bedarf es meiner eignen Arbeit, bey meinen schwachen Kräften, nicht weiter, und es bleibt mir nur noch der Wunsch übrig, daß mehrere auf diesem nun einmal gebahnten Wege fortwandeln, und durch reife Erfahrung entweder meine Beobachtungen immer mehr berichtigen, oder über andere Krankheiten, welche ich nicht untersucht habe, die ihrigen eben so rein, offenherzig und ohne Aufwand von prahlender Gelehrsamkeit mittheilen mögen.

Bey dieser Concurrenz, bey diesem Eifer von mehrern, wo größre Erfahrung des Einen die Bemerkungen des Andern bestätigt, muß unsre Wissenschaft sich immer mehr aufklären, und dies zuletzt für die leidende Menschheit reiner Gewinn werden. Wenn ich dagegen an dieser nützlichen Arbeit nicht weiter Antheil nehme, sondern mit diesem Bändchen mein Werk endige, so kann ich nicht anders als, über die erreichte Absicht sehr erfreuet,

und

und über den bisher erhaltenen Beyfall gerührt, die Feder niederlegen. Dieser allein würde jeden andern ermuntern, sie in Bewegung zu erhalten, und, bey einem bessern Gefühle von Kräften, die Arbeit fortzusetzen.

Der Buchdrucker hatte den Anfang dieses Bandes, den Aufsatz K: über die Dysurie der Alten, schon in Händen, als mir die Preisaufgabe der K. K. medicin. chirurg. Josephs-Akademie zu Wien, grade über diesen Gegenstand, als Krankheit alter Männer, zu Gesichte kam. Ich darf und will also, weil ich hier meinen Namen nenne, nach der bey einer solchen Aufgabe sanctionirten Gewohnheit, keinen Anspruch auf den Preis machen. Es würde mir aber doch der Beyfall dieser Gesellschaft sehr schmeichelhaft seyn. Ich darf wenigstens hoffen, manchem Andern, der sich um den Preis bewirbt, brauchbare Materialien zu seiner Arbeit geliefert zu haben. Hannover, im April 1802.

Inhalt.

K. Dysurie. Beschwerliches Uriniren; a) von verdickten Häuten der Harnblase; b) von vergrößerter Prostata. Seite 1

Unglaublich viele Ursachen gibt es von Dysurie. S. 3

Es ist schwer, sie zu entdecken. S. 4

Es gibt nicht einmal gewisse Zeichen von der Existenz eines Steins in der Blase, ob man gleich sondirt, und man hat sich da oft geirrt. S. 4

So fand der Verf. auch die Substanz der Nieren, ohne alle vorhergehende Zeichen, einmal ganz destruinirt. S. 6

Desault's Verdienste um diese Krankheiten. S. 8

Der

Der Verf. schränkt sich bloß auf Dysurie und Ischurie ein. S. 10

Urinblasensteine sind in Hannover die größte Seltenheit. Ebend.

Diese Dysurie ist gemeiniglich nur bey alten Leuten zu finden. S. 11

Sie begreift auch Retention und Incontinenz des Urins unter sich. S. 12

Sie entsteht von verringerter Capacität der Blase. S. 13

Nicht von Schwäche, sondern von verdickten und verhärteten Häuten der Blase. S. 14

Die Leichenöffnungen bewiesen dieses. S. 15

Morgagni und Portal haben dadurch zuerst darauf aufmerksam gemacht. S. 16

Diagnostische Zeichen dieser Dysurie. S. 17

Frauenspersonen scheinen frey davon zu seyn. S. 18

Aber nicht wegen Kürze der Urethra. S. 19

Zeichen, wenn sie von einer vergrößerten Prostata entstehet. S. 20

Von sogenannten Blasenhämorrhoiden, auch Blutharnen, liegt oft die Quelle in der Vorsteherdrüse. S. 23

Diese Art Dysurie ist in Hannover sehr häufig. Ebend.

Worin

Worin diese beiden Arten von Dysurie übereinkommen. S. 24

Wodurch sie sich unterscheiden. S. 26

Ein ehmaliger Tripper legt gewöhnlich den Grund zu der Krankheit der Prostata im Alter. S. 32

Unterschied des venerischen und Trippergifts. S. 33

Diese Dysurie entsteht nicht von einer Paralysis der Blase. S. 34

Auch nicht von einem Krampfe. S. 35

Abgeschmackte Gewohnheit, jeden Schmerz einen Krampf zu nennen. S. 35

In Demerary ist diese Krankheit endemisch. S. 37

Ein merkwürdige Krankheitsgeschichte. S. 39

Die Urinblase geborsten. S. 42

L. Hydrops cerebri, Hydrocephalus internus, die Hirnwassersucht, der innere Wasserkopf; Vermitio, Krankheit von Würmern, und Febris intermittens soporosa, Todtenfieber mit einander verglichen. S. 47

Ist schwer zu erkennen, und muß bey versteckten Kinderkrankheiten dem Arzt oft auch wieder aus der Noth helfen. S. 51

Der erfahrne Fothergill gesteht, daß er sie mit einer andern verwechselt habe. S. 52

Weikard leugnet sie ganz, und wird widerlegt. S. 52

Der Verf. will keine ausführliche Geschichte der Hirnwassersucht schreiben. S. 55

Die Engländer haben uns die ersten genauen Zeichnungen davon geliefert. S. 56

Einige halten es für ein entzündliches Uebel. S. 57

In welchem Alter sie erscheine. S. 58

Sie ist oft hitziger Art. S. 59

Wie sie alsdann sich verhalte. Ebend.

Ihre chronische Beschaffenheit und ihr Gang. S. 65

Frieselknötchens verkündigen in beyden Fällen einen nahen Tod. S. 67

Es gibt hier jedoch keine pathognomonische Zeichen der Krankheit. Ebend.

Eine Taenia hydatigena scheint oft ähnliche Erscheinungen veranlassen zu können. S. 69

Wahrscheinliche Entstehung der hitzigen und chronischen Art. S. 71

Ein eigentliches Wurmfieber, das immer einen gewissen Caracter hätte, wird von dem Verf. geläugnet. S. 72

Auch andre Beobachter sind dieser Meinung. S. 73

Die

Die Würmer verdienen überhaupt mehr Toleranz, als man ihnen gewöhnlich widerfahren läßt. S. 75

Sie sind oft eben so unschuldig als andre Dinge, die man bey einer versteckten Krankheit oft als Ursache angibt. Ebend.

Hunters Zeugniß von Leichenöffnungen hergenommen. Ebend.

Andre Gründe für ihre Unschuld. S. 78

Selbst des so fürchterlich scheinenden Kettenwurmes. S. 79

Eine Krankheitsgeschichte. S. 80

Inzwischen darf man sie doch bey convulsivischen Krankheiten nicht ganz aus den Augen verlieren. S. 81

Die Beschreibungen von Wurm-Epidemien sind sehr unzuverlässig und verdächtig. S. 82

Auch gehören die Lumbrici effractores wohl unter die pathologischen Fabeln. S. 85

Verwechselung der Ursache und Wirkung ist hier gewöhnlich. Ebend.

Der Verf. wünscht Wurmschleim kennen zu lernen. S. 86

Die Zeichen von Würmern sind sehr trüglich. Ebend.

Es

Es ist also schwer, eine Wurmkrankheit mit einer andern zusammen zu stellen. S. 88

Phänomene, wodurch sich jedoch allenfalls die Wirkung von Würmern von Hirnwassersucht unterscheidet. S. 89

Interessanter und wichtiger ist die Vergleichung der Hirnwassersucht mit dem Todtenfieber. S. 92

Beyde werden gewiß öfter mit einander verwechselt. Ebend.

Wird aus einer Krankengeschichte bewiesen. S. 95

Die perniciösen Wechselfieber befallen auch Kinder, nicht bloß Erwachsene. S. 100

Eine Krankengeschichte des Verf. S. 101

Eine andre von Torti. S. 102

Unterschied des soporösen Fiebers und der Hirnwassersucht. S. 105

Eine Krankheitsgeschichte von Werlhof. S. 106

Ob die Hirnwassersucht zu Wassersuchten oder zu Schlagflüssen zu rechnen sey. S. 107

Von einem Polypen im sichelförmigen Sinus. S. 112

Die thalami nervorum opticor. zerstöret. S. 117

Blindheit nach einem Scharlachfieber. Ebend.

Große

Große Wirkung des Quecksilbers in der Hirnwassersucht. S. 118

M. 1) Urticaria, Urticatio, Nesselsucht; Febris urticata, Nesselfieber; 2) Scabies, Krätze; 3) Morbilli, Masern. S. 121

Erschreckliche Verwechselung der Ausschlagkrankheiten, und Ursache davon. S. 123

Auch die 3 genannten Krankheiten werden oft mit einander verwechselt. S. 129

Urticatio und febris urticata stehen in eben dem Verhältnisse, wie Pemphigus und febris bullosa, oder wie morbus maculos. und Petechien. S. 132

Wenn sie gleich unwichtig ist, muß sie doch wegen einiger Sonderbarkeiten den Pathologen interessiren. S. 133

Gemählde derselben S. 134

Ihre große Verschiedenheit unter sich. S. 137

Ihre Entstehung vom Genusse der Muscheln; auch Krebsen. S. 139

Die Muscheln geben dem praktischen Arzte einen Wink. S. 142

Merkwürdigkeiten bey dieser Krankheit. Ebendas.

Ei-

Einige Krankheitsgeschichten. S. 143

Hat öfter mit Krätze Aehnlichkeit, als man glauben sollte, und wird gewiß leicht damit verwechselt. S. 145

Der Unterschied von beyden. S. 147

Masern sind schwerer davon zu unterscheiden. S. 151

Die Zeichnung findet der Verf. hier überflüssig. Ebd.

Er hätte gern sie von den sogenannten Rötheln geliefert. S. 152

Schwankender Begriff davon. S. 153

Aehnlichkeit von Masern und Nesselfieber. S. 154

Ihr Unterschied. S. 156

N. Dysphagia, das beschwerliche Schlingen als idiopathische Krankheit des Oesophagus. S. 116

1) von verringerter Capacität desselben;
2) von einem Hindernisse krampfigter Art;
3) von einem paralytischen Zustande desselben und einer Erschlaffung der Häute, auch des Pharynx.

Der Gang ist von allen 3 sehr gleichförmig. S. 165

Bey allen ist eine Rumination, kein wahres Erbrechen. S. 167

Sie sind aber doch sehr unterschieden. S. 169

Vergrößerte Drüsen in der Nähe sind die gewöhnlichste Ursache. S. 170

Genau anatomisch läßt sich dieses Hinderniß vor dem Tode nicht bestimmen. S. 171

Es gibt jedoch allgemeine Zeichen. Ebend.

Die Jugend ist nicht frey davon. S. 175

Erzählung zweier Krankengeschichten. Ebend.

Ueber die therapeutische Behandlung. S. 177

Die Würkung des Quecksilbers scheinen die Engländer zuerst bekannt gemacht zu haben. S. 159

Auch die Holländer haben große Verdienste um diese Krankheit. S. 180

Wagler heilte schon 1773 die Krankheit mit Sublimat; eine Geschichte von ihm. S. 181

Zeichen der krampfigten Dysphagie. S. 182

Krankheitsgeschichten von dem Verf., von Johnstone und von Zimmermann. S. 184

Von der paralytischen Beschwerde im Schlingen. S. 187

Phänomene bey dieser Art. S. 188

Wir=

Wirkung der bittern Mittel dagegen wird erklärt. S. 190

Erzählung einer Krankheitsgeschichte. S. 191

Die Pharyngocele, der Beutel am Oesophagus, ist unheilbar, aber sehr selten. S. 192

Erscheinungen dabey. S. 193

Eine Leichenöffnung. S. 195

Woher der viele ausgeworfene Schleim hier entstehe. S. 196

Irriges und empörendes Heilverfahren, Schleim wegzuschaffen oder Stuhlgang zu befördern. S. 197

Diese Art Dysphagie ist vielleicht Folge eines vorhergehenden andern Hindernisses bey jungen Leuten. S. 198

Gewöhnlich findet man sie aber bey Alten. S. 199

Die diagnostische Untersuchung sehr wichtig, ob eine Verengerung oder Erweiterung da sey. S. 200

K.

Dysurie. Beschwerliches Uriniren.

a) von verdickten Häuten der Harnblase.

b) von vergrößerter Prostata.

§. 86.

Es würde wenig Belesenheit, und eben so wenig Erfahrung verrathen, wenn Jemand bey einem beschwerlichen Urinlassen immer einerley Ursache annehmen, und immer einerley Mittel anwenden wollte. Unglaublich manchfaltig, fast unzählig, und ganz verschieden sind die Ursachen von dieser Beschwerde, besonders von der Retention, wovon man sich sehr bald überzeugt, wenn man nur Desault's höchst interessantes Werk a) lieset, oder die 44 Arten von Ischurie bey Sauvages

a) Tr. des maladies des voies urinaires, par Bichat. A. VII.

vages übersiehet, welche sein Commentator noch bis auf 59 vermehrt hat b). Es ist daher von der äußersten Wichtigkeit, sie einzeln aufzusuchen, und von einander zu unterscheiden, wenn man seinen Kranken wahrhaft nützlich werden will. Aber es ist nicht wenig schwer, diese verschiedenen Ursachen zu entdecken, und man muß sogar nicht einmal glauben, daß, wenn ein Blasenstein die Ursache der Beschwerde ist, sich dieses sogleich durch Sondiren ꝛc. herausbringen lasse. Ein großer Stein, den man doch wohl mit dem Catheter ꝛc. entdecken müßte, ist oft so sehr in dicken zähen Schleim eingehüllet, wie Morgagni auch schon erinnert c), daß der Wundarzt zweifelhaft wird, von welcher Art der harte Körper und Widerstand sey, auf den er mit dem Catheter stößt; die mit der Blase selbst verwachsenen oder enkystirten Steine nicht einmal zu nennen, welche oft den erfahrensten Wundarzt irre machen können, wovon Rutty schon

b) Nosologia methodica edit. Daniel. Lips. Tom. V.

c) De causis et sedibus morborum. Epist. 42. Artic. 16.

schon ein Exempel anführt d). So klagte Jemand (bey Morgagni) so bestimmt über Blasenschmerzen, daß 6 nicht ungeschickte Aerzte alle die Ursache derselben in der Blase selbst für entschieden hielten, und doch fand man nach dem Tode nichts Besonderes in der Blase, das zu einem Steinschnitt hätte bewegen können, sondern in den Nieren große Steine. Ja, Stevenson fand sogar e) bey einem sehr beschwerlichen Drange zum Uriniren und einer tödtlichen Suppression des Urins so wenig in der Blase als in den Nieren etwas Ungewöhnliches. Ein Anderer bekam, wie Michaelis f) erzählet, von Zeit zu Zeit heftige, mit Fieber vergesellschaftete Schmerzen in der Blase, konnte nur wenig Urin auf einmal lassen, und hatte sehr häufigen Drang dazu; das Uriniren war sehr schmerzhaft, und es ging zugleich eine eiterähnliche Materie ab ꝛc. (wer würde da in einem Lande, wo der Blasenstein so häu-

d) Parsons und Rutty Beschreibung der Harnblase. S. 136.

e) Medical Journal. Vol. IX.

f) Briefe aus Neuyork, in Richters chirurgischer Bibliothek. VI. S. 156.

häufig vorkommt, an der Existenz desselben in der Blase gezweifelt haben?) Der Wundarzt entschloß sich auch wirklich zur Operation, die aber wegen Schwäche des Kranken noch verschoben, und wegen des bald darauf erfolgten Todes nicht gemacht wurde. In den Urinwegen fand man bey der Section nirgends einen Stein.

Noch mehr Aerzte haben die edle Aufrichtigkeit bewiesen, ihren Irrthum zu gestehen. Der erfahrne Oberteufer fühlte durch die Sonde einen fremden Körper in der Blase, den er für einen Steatom oder ähnliches Gewächs hielt, und doch fand sich bey der Section die Quelle des Uebels allein in der Niere, welche ganz durchfressen und exulcerirt war *). Ich habe selbst bey einem 60 — 70jährigen Manne, der niemals über Schmerzen in der Gegend der Nieren geklagt hatte, bey dessen Dysurie aber der Urin sehr bald wahren Eiter, nicht zähen Schleim, (als das distinctive Zeichen) fallen ließ, das Parenchyma von beiden Nieren so zerstöhrt gefunden, daß sie in leere Beutel verwandelt waren,

*) Museum der Heilkunde. I. 203.

ren, davon der eine etwa 3 Unzen Flüssiges enthielt, und der andere 6 Unzen halten konnte. (Man vergleiche Troja, auch Walter Krankheiten der Nieren und Harnblase, 1800. S. 11.) In einem andern noch mehr auffallenden Exempel glaubte der Wundarzt seiner Sache sogar so gewiß zu seyn, und den Blasenstein ausziehen zu müssen, daß wirklich auch die Operation gemacht wurde, und man fand — keinen Stein, sondern nachher, nach dem Tode des Kranken, die Blase knorpelartig*).

Wenn man sich also sogar hier noch irren kann: wie viel leichter muß denn der Irrthum da seyn, wo gar kein Sondiren Statt findet, oder dadurch nichts entdeckt wird, und der Catheter gar nicht, bey aller Dexterität des Wundarztes, in die Blase gebracht werden kann, wo bey einer Retention kein Urin erfolgt, und der Catheter zwar eindringet, aber sich einen Nebenweg, welches nichts Ungewöhnliches ist, und ich zweymal in den Leichen gesehen, gemacht hat!

In

*) Journal de Chirurgie, par Désault. II. N. 21.

In pathologischer Absicht hat gewiß von allen Aerzten keiner jemals so viel Leichen geöffnet als Morgagni, so daß man lernbegierigen Beobachtern bey seinem classischen Werke: de caussis et sedibus morb. nicht oft genug zurufen kann: Nocturna versate manu, versate diurna! und dennoch gesteht dieser mit Valsalva, daß die Diagnosis der Krankheiten der Urinwege höchst schwierig sey, und man nicht vorsichtig genug verfahren könne, über ihre Ursache zu entscheiden, oder daß man sich bey der Ursache der Dysurie gar zu leicht irre*). Der bey dem Krankenbette selbst ohne allen Zweifel die größte Erfahrung von diesen Krankheiten sich erworben hatte, und durch dessen Tod die Kunst den größten Verlust gelitten, der schon genannte französische Wundarzt Desault, hat durch seine meisterhaften diagnostischen genauen Untersuchungen in seinem oben angeführten Werke grade noch mehr bewiesen, wie schwer es sey, die verschiedenen Ursachen von einander zu trennen und zu unterscheiden. Die venerischen Ursachen

*) Epist. 42. artic. 3 et 5.

chen *) von Dysurie und Ischurie, die Ischuriae urethrales, machen allein schon eine genaue Untersuchung nothwendig.

Kurz, alle Aerzte und Wundärzte ohne Charlatanerie gestehen die Schwierigkeit, bey einer Dysurie sogleich die wahre Ursache zu entdecken, und man kann also nicht sorgfältig genug alle die Zeichen aufsuchen, wodurch eine Art der Dysurie sich von der andern, oder vielmehr ihre Ursache, unterscheidet und auszeichnet. Der Irrthum muß hier, so wie bey andern Krankheiten, die nachtheiligsten Folgen für den Kranken haben, und man würde eben so unverantwortlich handeln, wenn man bey jeder vorkommenden Dysurie immer den Stein vermuthen, und aufs Gerathewohl sogleich sogenannte lithontriptische oder chirurgische Mittel anwenden wollte, als bey jeder Dyspnoe immer krampfstillende; oder wenn man gar, wie Bonn (über Harnverhaltung und Blasenstich, 1794. S. 90) einen solchen traurigen Fall erzählt, und dem ich selbst einen andern

*) Man sehe nur einmal Swediaur Maladies syphilitiques. à Paris. an VI.

andern beyfügen kann, auf den Einfall käme, eine krampfigte Zusammenziehung in dem Blasenhalse bey einer Ischurie anzunehmen, und Mohnsaft zu geben.

§. 87.

Auch hier werde ich also wieder, nach meiner bisherigen Methode, nicht alle Hindernisse im Uriniren, nicht alle Ursachen vom beschwerlichen Urinlassen untersuchen, sondern nur einige Beschwerden dieser Art neben einander stellen, die sich sehr ähnlich sehen, aber eine eben so verschiedene Ursache haben, als sie eine verschiedene Behandlung erfordern. Retention gehört sowohl hierher, als Incontinenz des Urins, so wie unzählige andere Zufälle. Aber ich denke mich vorzüglich auf das einzuschränken, was man Dysurie und Ischurie nennt, und behalte da doch noch ein großes Feld zu bearbeiten. Von diesem wähle ich allein wieder die zwey auf dem Titel genannten Ursachen; denn die eigentlichen Urin- oder Blasensteine sind in dieser Gegend Deutschlands eine so große Seltenheit, wie ich schon bey einer andern Gelegenheit öffentlich erwähnt

habe,

habe, daß ich aus meiner Erfahrung wenig über diese Art Dysurie beybringen könnte, und ich freue mich dieser glücklichen Immunität von einem so schrecklichen Uebel so herzlich, als ich mir selbst Glück wünsche, es bloß in den Parisischen uud Londonschen Hospitälern kennen gelernt zu haben. Inzwischen ist es doch nicht ungewöhnlich, kleine Steine, ehe sie sich zu einer gewissen Größe gebildet haben, oder Grand mit dem Urin abgehen zu sehen, die oft sehr merklich und mit Schmerzen durch die Ureteres ans den Nieren herunterkommen, so daß man bey einer vorkommenden Dysurie diese auch hiesigen Orts nicht ganz aus den Augen verlieren darf.

Gemeiniglich ist die hier jetzt zu untersuchende Urinbeschwerde eine Krankheit alter Leute, alter Mannspersonen bey uns, und an dieser haben entweder verdickte Häute der Urinblase, oder eine vergrößerte Prostata so gewiß Antheil, daß man, wo man einen alten Mann über Dysurie klagen hört, fast immer eine von jenen beiden Ursachen annehmen kann. Ungeachtet der glücklichen Immunität von Urinsteinen in hiesiger Gegend findet man doch noch sehr oft die Vermuthung von

ihrer

ihrer Gegenwart in der Urinblase rc., sobald Jemand nicht mit der gewöhnlichen und natürlichen Leichtigkeit Wasser läßt oder hält. Wenn also meine jetzige Arbeit in andern Gegenden, in oder außer Deutschland, vielleicht überflüssig oder mangelhaft seyn könnte, so scheint sie doch hier zu Lande nöthig zu werden, wo man so wenig mit den eigentlichen Steinbeschwerden bekannt ist, und man sie also weit leichter mit einer andern Krankheit der Blase oder Urinwege verwechseln kann.

§. 88.

Unter beschwerlichem Uriniren verstehe ich hier eine jede Abweichung von der natürlichen Excretion des Urins, sie mag in Retention, Incontinenz des Urins, oder schmerzhafter Ausleerung bestehen — Ischurie, Dysurie, Strangurie. Ich denke besonders die verschiedenen Ursachen zu untersuchen. Incontinenz ist eine gewöhnliche Krankheit alter Leute; aber sie hat dann so wenig, als Dysurie überhaupt, einerley Ursache. Sie ist oft sogar Folge grade des entgegengesetzten Zustandes — der Retention, und entsteht alsdann plötzlich nach derselben.

Von

Von der ist jedoch hier die Rede nicht. Gewöhnlicher ist die Ursache, daß die Capacität der Urinblase verringert ist, selbige sich nicht mehr so als im natürlichen Zustande, sondern nur bis auf einen gewissen Grad ausdehnen kann, und also der Kranke, sobald sich nur ein wenig Urin in derselben wieder gesammlet hat, einen Drang empfindet, und ihn ausleeren muß, selten über 2 Unzen und über 2 Stunden ihn halten kann, der gewöhnlich, wenn diese Ursache der Incontinenz für sich allein besteht, rein und natürlich ist, aber, wenn zugleich eine Krankheit der Nieren sich damit verbindet, wovon man oft nicht die geringste Spur entdeckt, sich verändert. Entweder hat der Kranke jenes Drängen, und muß zum Nachttopfe eilen, wenn er nicht überrascht werden soll, oder er bringt zu einer andern Zeit lange darauf zu, ehe er etwas loswerden kann, sucht durch Anstrengung des Zwerchmuskels und der Bauchmuskeln, durch Drücken, den Fehler der Blase zu verbessern. Diese Incontinenz nimt allmählig ohne weitere Beschwerde zu; es entsteht zuletzt ein völliges Unvermögen, auch nur das Geringste, höchstens in Tröpfeln, vom Harn fortzudrücken,

drücken, und der Kranke stirbt oft allein daran, indem nämlich die Ursache derselben sich immer mehr vergrößert, verschlimmert, das heißt, die große idiopathische Krankheit der Blase nicht gehoben werden kann, und alles zuletzt in Vereiterung, Verwachsung und völlige Desorganisation derselben übergeht.

Jene oben erwähnte verringerte Capacität der Blase, als Ursache des öftern Urinirens, das bey allmähligem Zunehmen zuletzt in völliges Verhalten des Urins überzugehen pflegt, leiten einige bloß von Schwäche des hohen Alters her, und man muß freylich auch das Schwäche oder Atonie nennen, wenn die Blase ihren tonum verloren, und nicht Kraft genug hat, sich ganz auszuleeren; aber eigentlich ist es doch nicht bloß Schwäche, und der schlechte Erfolg, welchen die hier, selbst von Desault, angewandten stärkenden Mittel haben, beweisen es auch schon hinlänglich. Das Uebel entsteht vielmehr daher, daß die Häute der Urinblase sich im Alter unmerklich verhärten und dicker werden, die Blase deswegen also nur immer weniger Harn halten

kann,

kann, indem sie auch immer mehr ihre Contractilität verliert, so wie die Muskular-Fibern ihre Action.

Hätten uns die Leichenöffnungen nicht hierüber belehret, so würde man vielleicht eine solche Ursache nie vermuthet, sondern den Grund von dem öftern Uriniren, und der Dysurie allein nicht bloß in jener allgemeinen Schwäche des Alters überhaupt, sondern vielleicht in einer Schärfe des Urins, oder in andern reizenden Dingen, einem Steine u. s. w. gesucht, und dort stärkende, so wie hier sogenannte demulcirende rc. Mittel versucht haben; so wie es auch jetzt noch zuweilen von Schriftstellern wirklich geschieht: aber es ist fast unglaublich, wie sehr man zuweilen bey solchen Kranken die Häute der Blase verändert und verdickt findet, ohne in der Höhle derselben selbst etwas vom Steine rc. zu entdecken. Die Höhle der Blase wird oft so dadurch verkleinert, daß sie sich fast dem Auge entziehet; und die ganze Organisation der Blase habe ich zuweilen, ohne alle weitere Ursache, so verändert und zerstört gefunden, daß sie mehr einem Steatom als einer Blase ähnlich sahe (aber als sonderbarer

Con-

Contrast wurde sie einmal bey einem Säufer, der nie über Urinbeschwerde geklagt hatte und an einer andern Krankheit gestorben war, zu einer so ungeheuren Größe, bey der übrigens schönsten Organisation derselben, ausgedehnt, daß sie 6 Quartier Flüssiges enthalten konnte). Jedoch solche Fälle sind nicht sehr häufig, und ich verweile also bloß bey dem gewöhnlichen Dickwerden der Häute, das die Engländer Thickening of the coats of the bladder nennen, und die Franzosen unter Raccornissement de la vessie verstehen, wo man den fundum, noch mehr aber nach dem Halse hin die Blase oft einen bis zwey Finger dick siehet, und wovon man unzählige Exempel nebst Leichenöffnungen bey Portal, Morgagni und andern, theils schon genannten Schriftstellern *) beschrieben findet. Jene beiden großen Zergliederer scheinen mir die ersten zu seyn, welche die Aufmerksamkeit darauf, als auf Ursache von Incontinenz, erweckt haben, Morgagni 1760, Portal 1770, ob man gleich vorher dergleichen genug in den Lei-

*) Unter vielen andern im Museum der Heilkunde. Th. 1. S. 62.

Leichen gefunden, aber als Ursache davon über- sehen haben mogte. Walter hat sogar die Harngänge nicht nur erweitert, sondern auch er- staunlich verdickt gefunden*), und sein Vater die Membran des Eyerstocks**); so daß also die Verdickung der Häute überhaupt im menschlichen Körper, zumahl im Alter, auch zuweilen in jüngern Jahren, z. E. im Oesophagus ꝛc. gar nichts seltnes ist. Seltner, oder nirgends, sieht man aber die Zeichen angegeben, wodurch sich bey Lebzeiten des Kranken diese Blasenkrankheit von andern unterscheidet. Dies war also die Absicht bey meiner gegenwärtigen Arbeit.

Wenn die Häute der Blase ihre Elastici- tät verloren haben, und ihre Muskelkraft immer schwächer geworden ist (da man vielmehr glau- ben sollte, bey der Verdickung müsse sie zuneh- men), so leeret sich die Blase, obgleich die Kran- ken oft pissen müssen, nie ganz aus, und bey der Excretion geht aus eben der Ursache der Harn gewöhnlich nur tropfenweise ab; sie haben an- fäng-

*) De morb. ren. et vesic. 1800. pag. 15.

**) De morb. peritonaei. 1785. pag. 9.

fänglich keine Schmerzen. Gemeiniglich ist und bleibt die Blase, weil sie sich zuletzt gar nicht mehr zusammenzieht, über dem Schaambeine fühlbar und ausgedehnt. Die Härte und Ausdehnung derselben bewirkt bey zunehmendem Uebel entweder eine fast völlige Lähmung der untern Extremitäten (die sich aus dem Drucke der Nerven leicht erklären läßt, und ich bey zwey alten Männern gesehen habe), oder eine sonderbare Unruhe in den Beinen, daß die Kranken sie nicht stille halten können.

Nie habe ich Frauenspersonen mit diesem Uebel behaftet gefunden, nämlich einer Incontinenz des Urins aus der eben beschriebenen Ursache, obgleich selbige nach einer starken Geburt, nach einer Verletzung der Urethra, oder Suppression in der Schwangerschaft hier, so wie an andern Orten, gar nichts ungewöhnliches ist; ich entsinne mich auch nicht, bey Schriftstellern solche Exempel von Frauenspersonen gefunden, oder eine Leichenöffnung beschrieben gelesen zu haben, wo die Blasenhäute ungewöhnlich dick gewesen wären. Ich kann jedoch mit Baillie nicht anneh-

annehmen, daß die Kürze der Urethra oder der Mangel der Prostata die Frauenspersonen davor sichere, und allein die Krankheit dieser Drüse gewöhnlich Anlaß bey Mannspersonen zu dem Dickwerden der Blasenhäute gebe; denn gewiß findet man die Blase auch bey Männern zuweilen, obgleich selten, verdickt, ohne daß die Vorsteherdrüse vorher angegriffen gewesen, und in den Leichen sind nicht immer beyde Krankheiten zugleich gefunden worden. Mir ist es wahrscheinlicher, daß das weibliche Geschlecht so wenig von dieser Incontinenz als von einer andern Krankheit des Alters frey bleibet, sich uns aber aus Schaamhaftigkeit nicht entdeckt, sich leichter an sein Schicksal gewöhnt, und sie für unzertrennlich vom Alter ansiehet.

Nachdem ich diese Vermuthung schon niedergeschrieben, finde ich sie wirklich von Portal durch die Geschichte und Oeffnung einer Frau bestätiget, wo die Blase ungewöhnlich klein, als eine Nuß, und der Blasenhals sehr verhärtet war; die Wände wie Knorpel*).

*) Mémoires de l'acad. d. sciences. 1770. p. 236. Auch in der kürzlich veranstalteten nützlichen Sammlung

§. 89.

So wie bey der Verhärtung der Blasenhäute die Beschwerde im Uriniren allmählig und langsam entstehet, so erscheint sie bey der Vergrößerung oder Verhärtung der Prostata fast immer plötzlich, und wird alsdann gewöhnlicher Suppression als Incontinenz des Urins. Zeigt sich bey dem Catheterisiren Blut, so ist diese Ursache der Suppression noch wahrscheinlicher. Die Untersuchung aber durch den Mastdarm entscheidet über die Gegenwart dieser Ursache noch gewisser, und beweiset, daß durch die vergrößerte Drüse der Blasenhals oder die Harnröhre zusammengedrückt, und der Abfluß des Urins gehemmt wird. Diese Kranken leiden daher auch hier fast eben so viel Schmerzen, wie bey einem Steine, von dem Drange zum Uriniren, nach dem Perinäo hin; aber selten, oder nie, wie bey Steinbeschwerden, lange Zeit vor der Retention, so daß sie vorher schon gewarnet wären.

Die-

seiner Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. P. A. Portal. Tom. I. 1800. pag. 49.

Diese Schmerzen sind oft ganz rein entzündlicher Art, und sind auch, wenn die Urinbeschwerde, besonders Ischurie, plötzlich eintritt, mit Fieber und den gewöhnlichen Zufällen desselben verbunden. Haben sie aber bloß eine Anhäufung vom Blute in der Oberfläche der cellulosa und der gefäßreichen Drüse und ihrer Nachbarschaft zum Grunde, so sind sie nicht so empfindlich, selbst wenn man durch den Mastdarm auf die Drüse drückt. Sie erfordern also auch eine ganz andere Behandlung antiphlogistischer Art, Blutausleerungen durch Blutigel rc., nachher Quecksilber rc. Dieser ganze Zustand ist öfter verbessert und diese Krankheit gehoben worden, als jene der Blase, wo man wol nicht leicht ein Exempel finden wird, daß sie geheilet worden. Die große Wirkung der Quecksilberpillen, welche Gilchrist beschrieben hat*), war entweder anscheinend oder von kurzer Dauer, oder der ganze Zustand acuter, entzündlicher Art, da er selbst ausruft: Quecksilver is a powerfull antiphlogistic — oder es mogte gar das an-

*) Edinburg. essays and observat. 1771. Vol. III. p. 471.

andre Uebel der Prostata seyn, wogegen ich gleichfalls das Quecksilber von großer Wirkung gefunden habe. Wirklich hieße auch „die Verhärtung der Häute bey alten Leuten heben oder verbessern wollen" „alte Leute wieder jung machen", da sie eine Folge oder Begleiterinn des Alters ist, und man solchen Kranken keinen bessern Rath geben kann, als daß sie immer mehr lernen, mit dem Catheter selbst zu manoeuvriren, ohne Beystand des Wundarztes; hingegen ist die Vergrößerung der Prostata nicht so unzertrennlich vom Alter, oder immer auf dasselbe eingeschränkt, auch wirklich oft dem Quecksilber gewichen.

Die Krankheit hat in andern Gegenden große Aehnlichkeit mit wahren Steinbeschwerden; wo diese aber so selten sind, als hier zu Lande, da können sie nicht leicht Jemanden irre machen. Hier ist ferner die Blase, wenn sie einmal ausgeleert ist, nicht mehr, wie dort bey der idiopathischen Krankheit der Blase selbst, fühlbar, aber desto deutlicher die Größe der Drüse durch den Mastdarm zu entdecken. Der Catheter wird nur mit großer Mühe in die Blase gebracht, wo der

der Wundarzt alsdann den Widerstand auch wol für sogenannte Carunkeln, für eine Verengerung der Harnröhre venerischen Ursprungs, oder Ueberbleibsel eines Trippers, hält, da doch die Bougie erst am Blasenhalse das für den Kranken schmerzhafte Hinderniß antrifft. Der Kranke kann fast nicht anders Urin lassen, als wenn er aufrecht auf den Beinen steht, oder, wie ich einen Fall gehabt habe, sogar ganz vorwärts übergebeugt; es kommt ihm vor, als ob im Mastdarme verhärtete Excremente lägen, davon er durch den Druck sich zu entledigen sucht. Sehr oft liegt vom Blutharne allein die Quelle in der kranken Vorsteherdrüse, daher denn auch, sehr begreiflich, die gemeiniglich dawider empfohlnen zusammenziehenden Mittel hier so wenig von Nutzen seyn können, als wo auch die sogenannten Blasen-Hämorrhoiden ihren Grund in der Prostata haben, welches gewiß wol nicht sehr selten seyn dürfte.

Diese Krankheit der Vorsteherdrüse ist hier in Hannover sehr häufig (ich habe einmal innerhalb wenig Jahren 4 alte Männer, und zwar

in einem einzigen kleinen Quartiere der Stadt, daran leiden sehen), obgleich die beschriebene Krankheit der Blase gewiß auch nicht selten ist. Von jener habe ich Kranke genesen gesehen, von dieser nie. Bey den an jener aber gestorbenen Kranken war die Prostata nicht bloß vergrößert, bis zu der Größe eines Gänseeyes, verhärtet, scirrhös, sondern zuweilen, so wie Morgagni, Frank, Desault ꝛc. auch gefunden haben, ganz verknorpelt, gemeiniglich die ganze Organisation derselben zerstöhrt, durch Eiter ganz verändert, bisweilen aber auch nur geschwollen (was die Franzosen Engorgement, Gonflement nennen), oder mit Fett sehr verwachsen. Desault fand oft nur die Blutgefäße auf der Oberfläche varicös und angelaufen.

§. 90.

Beyde Krankheiten kommen also darin mit einander überein, daß sie

1) im Alter erst entstehen. Ich habe sie noch nie bey Personen unter 60 Jahren gesehen, ob ich gleich deren viele gesehen, und finde auch bisher bey keinem Beobachter ein Exem-

pel vom Gegentheile (ich mögte jedoch deswegen nicht leugnen, daß zu der Geschwulst der Vorsteherdrüse so wie zu dem organischen Fehler der Blase selbst, z. E. Steine rc., auch in frühern Jahren Anlaß geben können), wenn man nicht etwa eine ähnliche Beschwerde kleiner Kinder auch Incontinenz nennen will, die aber einen ganz andern Grund hat.

2) Sie äußern sich beyde durch einen öfteren Drang zum Uriniren, und überhaupt durch eine oder andre Beschwerde bey dem Urinlassen.

3) Bey beyden Krankheiten entdeckt man die Harnblase über dem Schaambeine ausgedehnt.

4) In beyden ist der Urin, wenn nicht etwa bey dem Catheterisiren Blut damit vermischt ist, rein und von ganz natürlicher Farbe; wenigstens im Anfange und bey dem Entstehen derselben.

5) endigen sich beyde entweder mit einem völligen Verhalten des Urins, oder mit einer Incontinenz desselben. Man sollte zwar glauben,

ben, die vergrößerte Prostata müsse, indem sie die Harnröhre beenget und zusammendrückt, bloß eine Suppression des Urins verursachen können; aber so wie jene Incontinenz alter Leute zugleich auch Retention ist, indem immer etwas in der Blase zurückbleibt, so hat Frank auch schon*) bemerkt, daß sie eben sowohl eine Incontinenz bewirken könne, indem sie zuweilen nur auf einer Seite schwillt und scirrhös wird, und so verhindert, daß sich die Oeffnung der Blase völlig schließt. Noch gewisser erfolgt diese Incontinenz aber, wo durch die Länge der Dauer die Substanz der Drüse immer mehr angegriffen wird, in Vereiterung übergeht, und Abscesse entstehen, die sich dem Blasenhalse nähern ꝛc.

Beyde Krankheiten unterscheiden sich jedoch, wie man zum Theil aus der oben gemachten Beschreibung derselben schon wird bemerkt haben, und ich also fast nur wiederholen darf, so:

1) die

*) De curand. homin. morb. V. 205.

1) die vergrößerte Prostata, besonders im entzündlichen Zustand derselben, verräth sich, wenn man sich von der Abwesenheit anderer Hindernisse im Urinlassen überzeugt, und sonst noch keine Untersuchung in Rücksicht auf diese Drüse durch den Mastdarm gemacht hat, oft schon allein durch plötzliches Verhalten des Urins; aber der Verdacht auf die Drüse wird größer, wenn der Kranke vorher viel geistiges Getränk, oder Mineralwasser (wie ich zweymal gesehen habe) genossen hat. Bey den verdickten Häuten der Blase entstehet die Urinbeschwerde allmählig, sehr langsam, und sie bestehet mehr in einer Incontinenz, einem stärkern Drange und unwillkührlichen Abflusse, obgleich, da sich die Blase niemals ganz ausleeret, auch dieses zugleich eine Art von Verhalten ausmacht, wie man denn auch die Blase hier, so wie dort, gleichfalls über dem Schaambeine fühlbar ausgedehnt findet.

2) Bey der von der angeschwollnen Prostata entstehenden Ausdehnung der Blase, und der Retention des Urins, verliert sich, wenn das

Cathe-

Catheterisiren glücklich ausfällt, diese Ausdehnung wieder, wenigstens eine Zeit lang; bey der andern Krankheit bleibt aber immerfort, und Jahre lang, die Blase fast ohne alle Schmerzen fühlbar ausgedehnt, selbst wenn einmal eine große Quantität Urin von selbst abgegangen, oder durch den Catheter abgezapfet worden.

3) So wie die andere Blasen-Krankheit langsam und allmählig entsteht, endigt sie sich auch langsam; die vergrößerte Vorsteherdrüse hingegen tödtet oft in wenig Tagen, selbst wenn die Retention durch den Catheter gehoben wird, und es ist alsdann gemeiniglich ein entzündlicher Zustand mit allen Zufällen dabey, welche ein solches Fieber zu begleiten pflegen. Wenn die Krankheit auch länger dauert, die Drüse sich völlig verhärtet, scirrhös wird, oder in Vereiterung übergeht, endigt sie sich doch noch geschwinder, auf eine unglückliche Art, als jenes Uebel.

4) Der Kranke stirbt hier oft innerhalb 7 Tagen, obgleich er, wie ich mehrere Fälle ge-

sehen habe, keinen sehr lebhaften entzündlichen Schmerz in der Gegend dieser Drüse empfindet, und den Arzt also sicher machen könnte, der nicht scharf genug beobachtet. Geht nach dem Catheterisiren entweder allein Blut ab, oder mit dem Urin, so ist, wenn man nicht offenbar von der Existenz einer andern Ursache überzeugt ist, der Unterschied beyder Krankheiten noch merklicher; denn dieses geschiehet bey jener, so lange sie allein existiret, niemals.

5) Selten sind nämlich diese beyde Ursachen von Dysurie von einander getrennet, und man findet nicht leicht die Blasenhäute nach dem Tode verdickt, wo die Prostata nicht auch angegriffen wäre. Oefter ist jedoch die vergrößerte Drüse eine Krankheit für sich, und ohne jene Verhärtung der Blase.

6) Der bey der Retention des Urins von vergrößerter Vorsteherdrüse entstehende geringe oder auch entzündliche Schmerz äußert sich bey jenem organischen Fehler der Blase selbst niemals, wo nicht durch die Länge der Dauer

das

das Uebel einen schlimmern Caracter angenommen.

7) Bey dem aus vergrößerter Prostata entstehenden Verhalten des Urins wird der Catheter fast immer mit der größten Mühe in die Blase gebracht, und selbst mit der geübtesten Hand oft gar nicht; hingegen bey dem Verhalten aus der anderen Ursache mit Leichtigkeit, und er pflegt alsdann die Blase auch ganz auszuleeren.

8) Bey der Krankheit der Vorsteherdrüse ist zwar im Anfange, so wie bey der andern, der Urin natürlich; wenn sie aber eine Zeit lang fortdauert, oder in ein chronisches Uebel übergehet, Erosionen ꝛc. entstehen, weichet die Farbe ꝛc. des Urins bald von der natürlichen ab; er nimt oft einen besondern Gestank an, und macht, wenn er einige Stunden gestanden hat, einen starken eiterigten Bodensatz. Bey der simplen Krankheit der Blasenhäute bleibt der Urin Jahre lang natürlich, wenn nicht zuletzt die Häute auf eine gefährlichere Art angegriffen werden, wo alsdann eine klebrigte Materie abzu-

abzugehen pflegt, die sich vom Eiter aus den Nieren zugleich durch diese Zähigkeit unterscheidet, oft wohl unter dem Namen von Blasencatarrh alsdann gehen mag.

9) Bey der von verdickten Blasenhäuten entstehenden Dysurie ist die Bewegung zu Pferde und im Wagen so wenig beschwerlich, daß die Kranken sie vielmehr wünschen; aber bey einer Dysurie von einer kranken Vorsteherdrüse ist jene Bewegung, so lange es ein morbus acutus ist, sehr begreiflich, gar nicht möglich, und geht sie in ein chronisches Uebel über, so ist man ziemlich gewiß, daß die Prostata angegriffen sey, wenn der Kranke beym Reiten oder Fahren Schmerzen empfindet; doch muß man zugleich von der Abwesenheit wahrer Steinbeschwerden überzeugt seyn, als welche jene Bewegung auch nicht vertragen.

§. 91.

Aetiologische Untersuchungen gehören eigentlich nicht in das Gebiet der Diagnostik; aber ich mögte nicht gerne unbemerkt lassen, daß es mir

so

so wenig zweifelhaft, als vielen andern, besonders Morgagni, Frank, Girtanner *), scheint, daß ein vor vielen Jahren überstandener Tripper gewöhnlich den Grund zu der Anschwellung und Krankheit dieser Drüse gelegt hat, und dieses Gift selbige specifisch afficirt; diese Kranken also lange Zeit nachher noch für ihre Jugendsünden büßen müssen. Aber eben so unwidersprechlich ist es auch, daß diese Krankheit nicht immer aus dieser Ursache entstehet, sondern auch da, wo man nicht im geringsten den Kranken wegen eines ehemaligen Trippers in Verdacht haben kann, so wie sie Sims **) auch ohne Quecksilber geheilet hat, und Desault, wie er, gleichfalls der Meynung ist, daß sie sogar scrophulösen Ursprunges seyn könne. Meine Vermuthung ist außerdem auch noch, daß diese Drüse vorzüglich alsdann bey einem Tripper angegriffen werde, wenn bey demselben, wie es oft so geschiehet, Blut abgehet (davon wahrscheinlich nicht in der Harnröhre, sondern in der Prostata die Quelle liegt), und

*) von venerischen Krankheiten. Th. I. S. 192.

**) Michaelis Briefe aus Neuyork in Richters chirurg. Biblioth. VI, S. 155.

und der Ausfluß sehr geschwind durch saturninische oder ähnliche styptische Injectionen gehemmet worden.

Daß diejenigen, welche ehedem den Tripper gehabt haben, im Alter an Urinbeschwerden überhaupt zu leiden pflegen, das war schon den Beobachtern der vorigen Zeit, einem Lommius, Bagliw und noch ältern bekannt; daß aber alsdann die Vorsteherdrüse vorzüglich angegriffen sey, ist eine Entdeckung der neuesten Zeit, die wir den Leichenöffnungen zu verdanken haben; und Girtanner bezeugt sogar unter vielen andern ausdrücklich, daß es wenig alte Wollüstlinge gebe, welche nicht mehr oder weniger an einer verhärteten Prostata leiden. So wie bey Gelegenheit des Trippers die Hoden und Inguinal-Drüsen leicht afficiret werden, so wird hier auf eine ähnliche, obgleich auf eine weniger sichtbare oder schmerzhafte Art, der Prostata das Trippergift mitgetheilet; der Wundarzt freuet sich unterdessen einer geschwind und glücklich geendigten Cur. Auch hierin, so wie in vielen andern Punkten, unterscheidet sich das Trippergift von dem eigentlich venerischen, daß es im Anfange

der Krankheit leicht nach den Hoden und Inguinal-Drüsen eilet, in chronischen Fällen aber die Prostata angreift; da hingegen das venerische Gift im Anfange nach dem Gaumen und den Drüsen &c. des Halses, in chronischen Fällen aber nach den Knochen schleichet und sich da festsetzet.

Die andere von mir beschriebene Krankheit hat gar sehr den Anstrich von Schwäche allein, wie ich schon oben erinnert habe, und könnte eben so leicht auch auf die Vermuthung leiten, daß es ein paralytischer Zustand der Blase, des Detrusors, des Sphinkters, seyn müsse. Höchst wahrscheinlich ist die Krankheit auch oft als eine solche angesehen, und nach der Idee behandelt worden; aber zu geschweigen, daß die wahre Paralysis der Blase, wovon man allerdings sehr viel Exempel siehet, die unter andern Dicksons glückliche Heilart beweiset, und die daher gar nicht zu bezweifeln ist, nicht leicht ohne Apoplexie, äußere Gewaltthätigkeit, Fall, Stoß &c. auf das Rückgrath, Heiligbein, oder Druck bey der Krümmung des Rückgraths, entstehet, so hat man in den letzten 50 Jahren gar zu oft die

wahre

wahre Ursache dieser Krankheit durch Sectionen entdeckt, als daß man bey den von mir angegebenen Zeichen noch dabey schwanken könnte.

Einer andern irrigen Idee über dieselbe muß ich noch ausführlicher begegnen, weil sie in Rücksicht der Therapie von desto größerer Wichtigkeit in den jetzigen Zeiten ist, wo man mit Opium wie mit destillirten Wässern spielt, und es auch sogar da anwendet, wo man nichts von einem eigentlichen Krampfe annehmen kann. Es wäre nämlich gar nicht befremdend, wenn man den öftern Drang zum Uriniren, bey der Abwesenheit von eigentlicher Steinbeschwerde, bey der natürlichen Farbe des Urins, bey der völligen Apyrexie ꝛc., für etwas Krampfigtes ansähe, und das Uebel mit krampfstillenden Mitteln zu bestreiten suchte. Wenigstens erinnere ich mich noch mit Schrecken einer gewissen Zeit, wo dieses gewiß geschehen wäre, da zwar Opium noch nicht so sehr gemißbraucht wurde als jetzt, aber ein angesehener Arzt mit seinen Papagoyen, den nachbetenden Aerzten, bis zu den Wärterinnen herunter, so sehr durch das Wort: Krämpfe,

 alle

alle Schmerzen verdrängt hatte, daß man nun nicht mehr von Kopfschmerzen, von Leibschmerzen, Stichen ꝛc. hörte, sondern die Kranken immer Krämpfe im Kopfe, Krämpfe im Leibe, Krampfcolik, und Krämpfe in der Seite ꝛc. hatten, und man damals auch zuweilen von Krämpfen in der Blase reden hörte. Es läßt sich gar nicht berechnen, zu wie vielem Unheile diese lächerliche Benennung mag Anlaß gegeben haben; denn da man bey Krämpfen auch krampfstillende Mittel zu gebrauchen pflegt, so war sehr begreiflich, daß man oft zu diesen, gewöhnlich erhitzenden, Mitteln griff, wo grade die entgegengesetzten nöthig waren, und ein solcher Fehlgriff die nachtheiligsten Folgen haben mußte. Gegen diese Idee von Krämpfen in der Blase kann ich also hier bey der beschriebenen Krankheit nicht dringend genug warnen, da alle sogenannte krampfstillende, nervenstärkende Mittel nicht nur, sobald man die beschriebenen Zeichen wahrnimt, ganz unnütz, sondern wirklich schädlich seyn müssen. In dem Falle, welchen Bonn (s. oben) erzählet, mußte man das Opium gar bald wieder weglassen, und bey einem meiner Kranken,

ken, dem es einmal, in meiner Abwesenheit, in Clystieren beigebracht wurde, wirkte es gleichfalls sichtbar nachtheilig, und konnte nicht fortgesetzt werden.

Ich kann hier eine Merkwürdigkeit nicht mit Stillschweigen übergehen, die mit der beschriebenen Krankheit in naher Verbindung stehet, daß sie nämlich, obgleich freylich mit einigen Abweichungen, in Demerary endemisch unter den dortigen Negern, beyderley Geschlechts, ist, wie der Wundarzt Macbeth in Duncan's medical commentar. 1795. vol. X. p. 232. sie beschreibt. Die Kranken klagen im Anfange durchgehends über eine unangenehme Empfindung und einen Schmerz in der Gegend der Blase, der sich nach der Eichel herunter verbreitet, und oft keine Berührung der Blase leidet, haben öftern Drang zum Urinlassen, und er geht alsdann mit Schmerzen und nur tropfenweise ab, wird im Verlaufe der Krankheit trübe, und es folgt oft etwas Blut nach. Einige bringen aschfarbigten Schleim mit demselben von sich. Bey andern ähnelte das

Uebel

Uebel einem Tripper, so daß man auch dadurch irre geleitet wurde, und es verkannte. Grand konnte man niemals in dem Urin entdecken. Antiphlogistisch behandelt, wich die Krankheit nicht, aber immer in wenigen Wochen, nach Copaiva, Balsam zu einem Quentchen Morgens und Abends gegeben, mit 2 Quentchen von arabischem Gummischleim und 30 Tropfen versüßten Salpetergeist nebst etwas Syrup vermischt. Unter 150 bis 200 Fällen, in einem Jahre, war nur ein Unglücklicher. In der Leiche fand man die Blase wie ein unförmliches scirrhöses Gewächs, ungewöhnlich vergrößert, und die Häute derselben erstaunend verdicket — beynahe bis zu einem Zoll. Der Verfasser entdeckte die Ursache von dieser Beschwerde in dem schlechten Wasser, das allein die Neger, nicht aber die weißen Colonisten trinken.

§. 92.

Es würde mein Buch unnöthiger Weise verdicken, wenn ich zu dem, was ich hier als Resultat meiner eigenen Erfahrung über diese beyden Krankheiten geliefert, und von andern Beobachtern zur Bestätigung entlehnet habe, noch

genau-

genauere Belege beybringen und einzelne Krankheitsgeschichten ausführlich erzählen wollte. Ich finde jedoch folgende aus mehr als einer Ursache so merkwürdig, sie ist so selten, und sie hat so große Beziehung auf die abgehandelte Materie, daß ich nicht zweifle, sie werde die Leser interessiren, und die Ausführlichkeit der Erzählung leicht entschuldigen.

Schon seit vielen Monaten hatte ein übrigens ganz gesunder Mann, von etwa 70 Jahren, an einer Incontinenz des Urins gelitten, die ihm besonders des Nachts beschwerlich wurde, wo der Urin ohne sein Wissen und unwillkührlich im Schlafe wegging. Im Sommer 1792 veränderte sich dieses Uebel so, daß es fast, wie es auch bey andern ähnlichen Kranken nicht ungewöhnlich ist, in das entgegengesetzte, in eine Retention, überzugehen drohete, und bey der Ausleerung des Urins zuweilen ein Hinderniß entstand, das sich erst nach einer halben Stunde, oder längern Zeit, aber von selbst und ohne chirurgische Hülfe, hob. Es wurde offenbar, daß in der Blase selbst eine Krankheit entstanden war,

die

die in diesem Alter nicht selten ist, zugleich verringerte Action oder Energie, und Erschlaffung der Muskeln ꝛc.; denn von andern Hindernissen der Ausleerung, als Verhärtung der Prostata ꝛc., war, nach der schärfsten Untersuchung, nichts zu entdecken; an eigentliche Steinbeschwerde konnte ich bey unsrer glücklichen Immunität allhier gar nicht denken. Auch war nirgends Schmerz in der Gegend der Blase damals zu bemerken. Bey dem Alter des Kranken blieb mir die Verhärtung der Blasenhäute am wahrscheinlichsten. Diuretische Mittel, auch Wildunger Wasser ꝛc. verschlimmerten den Zustand; Pyrmonter Wasser schien mehr leisten zu wollen, aber nur auch kurze Zeit. Inzwischen hinderte den Kranken dies alles doch nicht, zu Anfange d. J. (1795) noch einmal mit zu Felde zu gehen, und alles Ungemach des Krieges mit auszuhalten; vielmehr empfand der Kranke, da er als General den Feldzug mitmachte, wenn er, um sich nicht von der Gesellschaft auszuschließen, ziemlich viel Wein getrunken, gut gegessen, viele Stunden zu Pferde und in großer Anstrengung des Geistes zugebracht hatte, von seiner Beschwerde grade alsdann

dann am wenigsten. Inzwischen hatte sich selbige bey seiner Rückkunst nach Hannover in etwa einem Jahre doch so verschlimmert, daß er des Nachts wegen der Incontinenz des Urins gar nicht mehr ein eigends dazu verfertigtes Gefäß entbehren konnte, und Schmerzen im ganzen Umfange des Beckens, nach den Schenkeln herunter, nach dem Magen hinauf empfand, sich auch bey Tage nicht weit vom Nachttopfe entfernen, oder in Gesellschaft gehen konnte. Außerdem zeigte sich im Urin schon ein sehr verdächtiger eiterähnlicher Bodensatz, der, sehr zähe, fast am Gefäße anklebte, und merkliches Fieber. Dies alles besserte sich jedoch im August nach großen Gaben vom Liq. Terr. fol. Tart. noch einmal; da sich nämlich jener Bodensatz verlor, und der Kranke viele Stunden das Wasser ohne Unbequemlichkeit halten, ausreiten konnte, und selbst im Schlafe wenig Urin unwillkührlich abgieng. Aber auch diese Besserung war nur von kurzer Dauer; der Drang zum Uriniren wurde sehr beschwerlich, das Fieber anhaltend, und ungeachtet der Incontinenz wurde nun die Urinblase immer mehr fühlbar, stieg immer mehr aus

dem

dem Becken in die Höhe; der Kranke sprach als Ingenieur immer von seiner Bombe im Leibe. Im November war sie völlig rund, gewölbt, isolirt mitten im Leibe bis an den Nabel herauf zu fühlen, und die Berührung sehr schmerzhaft. Zugleich theilte sich der Schmerz, wenn man tief auf die Blase drückte, den benachbarten Theilen, besonders dem Mastdarme mit. Diese Ausdehnung der Blase hinderte jedoch am Gehen den Kranken nicht; aber die Bewegung im Bette nach einer oder der andern Seite wurde peinlich. Im December ließ der Urin wieder ein starkes Sediment fallen, das jetzt schon viel gewisser eiterigt war. Der Kranke nahm allmählig an Kräften ab, und als er am 12. December schon lange über verhaltene Blähungen ꝛc. geklagt hatte, und sich auf dem Nachtstuhle durch einen leichten Druck davon zu befreien suchte, fühlte er unten im Leibe plötzlich, wie er sich ausdrückte, ein Kluppen, und einen sehr heftigen Schmerz, als wenn ihm da etwas zerrissen, und seine Bombe zersprungen wäre. Er konnte nur mit großer Mühe wieder ins Bette gebracht werden, und bey genauer Untersuchung fand sich, daß auch

die vorher so sehr ausgedehnte und fühlbare Blase wirklich ganz verschwunden war. Es ging auch seit der Zeit kein Tropfen Urin weiter ab. Der Kranke litt von jetzt an alle 5 — 10 Minuten die heftigsten stechenden Schmerzen, die nicht mehr local in der Gegend der Blase waren, sondern sich durch den ganzen Unterleib bis nach der Herzgrube herauf verbreiteten, besonders aber nach beyden Seiten der Blase hinunter. Der ganze Unterleib wurde bald darauf allgemein, wie von Luft, aufgeblähet, doch weich, und bey dem Berühren überall schmerzhaft. Es entstand oft nach dem Genusse des unschuldigsten, nicht reizenden Getränkes, noch gewisser von Arzney, ein Erbrechen, und man konnte also von der Seite dem großen Uebel nicht nahe kommen, so wie überhaupt von andern Seiten auch nicht, und bey der nunmehro wahrscheinlichen Zerreißung der Blase war alle Hülfe vergebens. Aeußerliche Umschläge ꝛc. schafften daher auch nicht einmal die geringste Erleichterung, und ich gerieth also in die schrecklichste Lage, worin ein Arzt nur kommen kann, ganz müßig und unthätig zusehen zu müssen, wie der Kranke am 14ten December

Abends,

Abends, bey völligem Verstande, und unter beständigem Schreyen vor Schmerzen, allmählig verschied, ohne daß übrigens seit jenem Zufalle, am 12. Decemb., im Pulse eine Veränderung vorgegangen wäre.

Bey der Oeffnung des Unterleibes fiel sogleich, anstatt des Urins, den man hätte erwarten sollen, eine große Menge Eiter in die Augen, der auch in kleiner Menge, und etwas Blut, jetzt mit dem Catheter durch die Harnröhre abgezogen wurde. Bey weiterer Untersuchung kam jedoch auch Urin in ziemlicher Quantität, unvermischt, in der linken Seite, zum Vorschein. Alle Theile des Unterleibes, Eingeweide, auch Nieren ꝛc. waren im gesundesten Zustande, ohne Schatten von Entzündung oder dergl. Die Urinblase aber war aus dem Becken heraufgestiegen, und über dem Schaambeine an den benachbarten Theilen aller Orten, nicht allein mit dem Bauchfelle, adhärent. An der rechten Seite derselben, nahe am fundo, in einer kleinen Entfernung vom Peritonaeo, zeigte sich ein Riß, wodurch 2 Finger eingebracht wer-

den

den konnten; durch denselben drang man in eine Cystis, in eine Höhle, die sich in den Häuten der Blase formiret hatte, noch eine große Menge etwas stinkenden Eiter enthielt, und durch Membranen mehrere kleine Fächer bildete, die mit der Höhle der Blase selbst in Verbindung standen. Die Blase war übrigens nicht außerordentlich groß, und die bey Lebzeiten des Kranken bemerkte fühlbare runde Erhöhung war sichtbar durch jene mit Eiter gefüllete Cystis entstanden. Der fundus der Blase war da, wo sich der Riß fand, zwar sehr dünn (wahrscheinlich durch Eiter größtentheils consumiret); nach dem Halse zu waren aber die Häute sehr dick, und die innere Oberfläche war nicht glatt, auch nicht, wie in ähnlichen Fällen, runzligt, sondern bestand aus dicken trabeculis carneis, wie ein Ventriculus cordis; — die Prostata natürlich.

Der lebhafte Schmerz, die 3 letzten Tage, entstand ohne Zweifel von dem ergossenen Eiter, so wie er diese oder jene Theile berührt hatte.

Ob man gleich bey Lieutaud, Morgagni, Baillie, Sömmerring, Conradi

radi und andern Verfassern pathologischer Anatomien, Exempel gesammelt findet von geborstener Blase, so bleibt die aus innerer Ursache zerrissene doch immer eine Seltenheit, und noch mehr ist es die Erzeugung eines besondern Abscesses zwischen den Blasenhäuten. In Absicht der innern Structur der beschriebenen Blase setze ich ein sehr ähnliches Exempel von Fothergill beschrieben, wo sich queer durch die Blase ein Septum, eine Membrane fand, die eine eigene Höhle formirte, und ein Loch hatte. Memoirs of the medical Society. Vol. I. p. 208. Es giebt noch mehrere Exempel, die ich aber alle nicht anführen mag. So hat Baillie ganz neulich noch eine völlig ähnliche Structur der Blase, und ihre Abtheilung in 2 verschiedene Höhlen beschrieben und anatomisch erkläret in seinem Appendix to the first edition of the morbid. Anatomy 1798. p. 105.

L.

1. Hydrops cerebri, Hydrocephalus internus; die Hirnwassersucht, der innere Wasserkopf.

2. Vermitio; Krankheit von Würmern.

3. Febris intermittens soporosa; das Todtenfieber.

§. 93.

Von einer so eben untersuchten Krankheit alter Leute gehe ich jetzt wieder zu einer Krankheit von Kindern über, welche eine der größten und gefährlichsten ist. Sie führet, außer den großen allgemeinen Schwierigkeiten, welche bey der Kenntniß der Kinderkrankheiten überhaupt obwalten, auch noch die mit sich, daß in dem Laufe derselben nicht eher als bis gegen das Ende auf der ganzen Oberfläche des Körpers das geringste zu entdecken ist, wodurch sie sich vor andern, auch ähnlichen, auszeichnete, oder das in die Augen fiele. Es wird daraus begreiflich, wie leicht eine Verwechselung derselben mit einer andern ähnlichen seyn müsse, da sie für sich allein

schon so schwer zu erkennen ist. Ich setze ihr daher hier 2 andre zur Seite, die ihr am ähnlichsten sind, nicht nur, um sie von diesen zu trennen, sondern dadurch zugleich ihr eignes Bild desto hervorstechender zu machen, wozu hoffentlich die vorläufige Beschreibung der Entstehung, der Form, der verschiedenen Phänomene und Symptome der Krankheit selbst noch mehr beytragen wird.

Die exanthematischen Kinderkrankheiten, welche immer ihren bestimmten Caracter haben, oft ganze Epidemien ausmachen, den Aerzten also Gelegenheit genug verschaffen, sie bey vielen hundert Kindern zu beobachten und kennen zu lernen, werden dennoch sogar verkannt, und mit andern oft verwechselt; was hat man also nicht bey einer ungleich seltnern Krankheit zu befürchten, wo alle jene sichtbaren Merkmale wegfallen, und die, wenn sie gleich oft ziemlich erwachsene Kinder befällt, die sich schon verständlich machen, und ihre Empfindung ausdrücken können, doch noch immer sehr versteckt bleibt! Man siehet auch wirklich, daß die Beobachter sich gar noch

nicht

nicht darüber verständigen können, sondern vielmehr kein Bedenken tragen, sich einer dem andern gradezu vorzuwerfen, die von ihnen beschriebene oder angeblich geheilte Hirnwassersucht sey eine andre Krankheit gewesen; darin stimmen aber sehr viele mit Watson überein *), daß man sie bey ihrer Entstehung leicht mit Wurmkrankheit, oder Anhäufung von Unreinigkeiten in den ersten Wegen verwechseln könne, obgleich in der Folge die Diagnosis leichter werde. Ohne Zweifel wird die Krankheit also nicht nur wirklich verkannt und verwechselt, sondern mag auch wol eben so oft manchen im Gedränge, bey einer versteckten Krankheit, zum Vorwande und zur Entschuldigung eines Sterbefalls dienen, wenn er auch nicht von ihrer Gegenwart überzeugt ist, so wie die Nerven, die Zahnarbeit, die Würmer 2c. bey solcher Gelegenheit ein gutes Rettungsmittel für uns abgeben, wo wir nicht zu befürchten haben, daß durch eine etwanige Section unser Irrthum offenbar werde. Wie sehr contrastirt damit die nachahmungswürdige

*) Medic. obs. and Inquir. IV, 85.

und zugleich beyspiellose Offenherzigkeit, womit einer der erfahrensten Aerzte *) gestehet, daß er sie 2—3mal selbst mit Wurmkrankheit wirklich verwechselt habe, und die vermeinte Hirnwassersucht geheilet worden sey, als nach dem Gebrauche bloß anthelmintischer Mittel Würmer abgegangen waren **)!

Auffallender wird es vielen Lesern seyn, wenn ich sie erinnere, daß man sogar die ganze Existenz dieser Krankheit geleugnet, und die ausgetretene Feuchtigkeit in den Hirnhöhlen allezeit bloß für eine natürliche Folge des Todes, nicht für die Ursache angesehen, so wie etwa die Gerinnungen von Blut in den großen Blutgefäßen, im Herzen, die falschen Polypen, wovon im 2ten Theile dieses Werks die Rede gewesen ist.

Die:

*) John Fothergill, der Quäker, dessen große Erfahrung und Beschäftigungen am Krankenbette ein jeder, der seine sehr lehrreichen Schriften nicht kennet, schon daraus allein beurtheilen kann, daß sie ihm gewöhnlich des Jahrs 12000 Pf. Sterl. einbrachten.

**) Collection of the works of J. Fothergill with notes — by J. Elliot. Lond. 1781. pag. 339.

Dieses Ableugnen, ohne Gründe ausführlich anzugeben, ist jedoch, so viel ich weiß, nur von einem einzigen geschehen, der sich auch über die Existenz der Brustbräune lustig macht, und dadurch entweder große Liebe zur Paradoxie oder kleine Erfahrung verräth. Der Arzt von reifer Erfahrung läßt sich bey einer ihm oft vorgekommenen Krankheit nicht leicht irre machen, und durch ein bon mot allein sie aus seinem nosologischen Systeme ausstreichen: er will wenigstens Gründe für die Nichtexistenz hören. Denn wenn nach einer genau caracterisirten Krankheit, nach gewissen von derselben fast unzertrennlichen Symptomen, sich nach dem Tode immer dieselben Erscheinungen in der Leiche finden, und sonst nichts, das man als Ursache des Todes mit Grunde annehmen könnte, so muß jener krankhafte Zustand doch wol als Ursache allein angesehen werden, und — eben so wohl eine tödtliche Hirnwassersucht existiren, als ein tödtlicher Herzpolyp! Ich darf daher, glaube ich, die Leser nicht erst hier so weitläuftig von der Wirklichkeit dieser Krankheit zu überzeugen suchen, als ich es vorhin von der Existenz eines wahren Herz-

polypen gethan, zumal da ich schon durch eine eigne sehr gründliche Schrift dieser Mühe überhoben bin *).

Die beiden unterschiednen Meynungen, da man die ursprüngliche Krankheit bald für einen wassersüchtigen, bald für einen entzündlichen Zustand hält, werde ich dagegen als weit wichtiger am Schlusse dieses Aufsatzes zu vereinigen, und zu zeigen suchen, daß beyde nicht ganz irrig sind. Jedoch ist bey allen diesen Untersuchungen mein Hauptmoment, durch so viele Kennzeichen, als möglich, die Krankheit herauszubringen, und alsdann von andern zu unterscheiden.

§. 94.

Kinderkrankheiten waren von jeher meine Lieblingsbeschäftigung, und weil ich zugleich darin ein gewisses Vertrauen von dem Publico genoß, so ist meine Erfahrung in diesem Fache von Krankheiten, also auch von diesem schrecklichen Uebel,

das

*) J. G. Lodemann diss. qua inquiritur in theoriam Weikardianam de hydrope cerebri. Gött. 1792.

das uns so viele Kinder raubt, bey dem man so wenig hoffen, und noch weniger versprechen kann, nicht klein, und ich bin vielleicht so glücklich, wo nicht durch die Zeichnung allein, doch durch die Darstellung derselben in einem andern Lichte, es kenntlicher zu machen, und darf hoffen, daß meine jetzige Arbeit nicht ohne alles Interesse bleiben wird. Ich werde daher auch, so vortreffliche Beschreibungen wir auch schon davon besitzen, hier wieder meine eignen Beobachtungen liefern, und auf meine bisherige Manier diese große Krankheit nach der Natur schildern, so wie ich selbst, sie zu copiiren, am Krankenbette Gelegenheit gehabt habe, und mit andern ähnlichen sie nachher zusammenstellen, gelegentlich aber die Leser erinnern, um Bestätigungen oder Abweichungen zu finden, daß sie Zeichnungen von andern mit den meinigen vergleichen. Wir armen Aerzte sind nur selten Mahler genug, haben vom Helldunkel und andern Feinheiten der Mahlerey zu wenig Begriff, rechnen also immer bey unsern Gemählden auf Nachsicht größrer Kenner, und hoffen, daß diese unsre Umrisse künftig einmal besser ausmahlen werden. Ich wenigstens kann meine

meine Arbeit kein vollständiges Gemählde nennen — vielleicht gewinnt es allein durch die Gruppirung — denn ich war auch nie Willens, eine ausführliche Geschichte der Hirnwassersucht, mit großer ausgekramter Gelehrsamkeit, und mit Citationen ausgeschmückt, zu schreiben.

Obgleich den Aerzten der Vorzeit diese Krankheit nicht unbekannt war, so haben wir doch hier wieder den englischen Beobachtern der neuern Zeiten die ersten instructivesten Krankengeschichten zu verdanken, wodurch sie uns mit den manchfaltigen Zufällen, und nachher durch die Leichenöffnungen, mit der Ursache genauer bekannt gemacht. Vorzüglich hat R. Whytt das Verdienst, zuerst den Gang dieser Krankheit genau beschrieben, und die Zeichen umständlich angegeben zu haben. Nachher haben viele seiner Landesleute das Bild mehr ausgemahlt, und Aerzte anderer Nationen nicht allein zur Nachahmung gereizt, sondern auch ihre Aufmerksamkeit mehr darauf rege gemacht. Meine Absicht ist erreicht, wenn ich durch meine darneben zu stellende Zeichnung zur genauen Kenntniß dieser

bisher doch noch immer sehr versteckten Krankheit auch etwas beytrage.

Das, was man Hirnwassersucht nennt, wo man nach dem Tode immer eine große idiopathische Krankheit unter dem Hirnschädel antrifft, besonders aber eine ungewöhnliche Anhäufung einer klaren Feuchtigkeit in den Hirnhöhlen (es versteht sich, daß ich hier gar nicht von dem so sehr sichtbaren äußern Wasserkopfe rede), zeigt sich dem beobachtenden Arzte nicht immer auf einerley Art, wenigstens nicht sogleich bey der ersten Anwandlung, und muß daher manchen ungeübten irre machen. Grade diese so unterschiednen Phänomene haben daher auch einige verleitet, immer nur einen solchen Caracter der Krankheit anzunehmen, der sich am leichtesten aus den von ihnen aufgefaßten Symptomen erklären ließ. So sieht man, daß einige sie immer als einen entzündlichen Zustand, andere wieder als ein chronisches, ganz davon abstechendes Uebel betrachten; wahrscheinlich weil sie das Uebel nicht allzeit in seiner verschiedenen Gestalt oder zu verschiedenen Zeiten, — auch nicht frühe genug zu

sehen Gelegenheit gehabt, und zu einseitigen Beobachtungen zu großes Vertrauen gehegt haben.

Die Krankheit schränkt sich auf kein gewisses Alter ein, sondern zeigt sich in dem zartesten Kindesalter fast bis in die Zeit der Mannbarkeit hinauf. Weil man sie in diesem Zeitraume am häufigsten bemerkt, so nimt man sie auch für eine Kinderkrankheit an. Unter 3 Jahren hat Fothergill selten ein Kind darin gesehen. Mein kleinster Kranker dieser Art war 19 Wochen alt, und über 9 Jahr alt habe ich noch kein Kind daran gefunden. Wenn man sie also auch bey Erwachsenen will beobachtet haben, wie Watson in den med. observat. and Inquir. Vol. IV. p. 86, und andre, so rede ich jedoch in der Folge immer von Kindern als von Kranken; denn es würde ein großer Mißbrauch des Worts, und sehr uneigentlich geredet seyn, wenn man das nach Kopfwunden zuweilen langsam entstehende Extravasat bey Erwachsenen so nennen, oder ich etwa von jenem Juden behaupten wollte, er habe die Hirnwassersucht gehabt, den ich von einem Sturz auf

den Kopf ähnliche Zufälle leiden sah, der sich lange Zeit in einem schlafsüchtigen Zustande befand, einen ungewöhnlich langsamen Puls hatte, zuweilen laut schrie oder gar brüllete, ob man gleich dergleichen bey der eigentlichen Hirnwassersucht auch findet.

So wie die erste Entstehung und der Anfang nicht immer auf einerley Art geschiehet, so weichet sie auch in ihrem Verlaufe und Fortgange von dem Gewöhnlichen oft ab, nachdem die entfernte Ursache unterschieden ist. Sie entstehet nämlich plötzlich, ohne alle Vorboten, in Gestalt eines Fiebers gemeiner Art, oder sie kommt, wie eine Krankheit chronischer Art, langsam angeschlichen, kündiget sich in weiter Entfernung durch leichtes Kopfweh zuerst an. In jenem Falle, wo sie plötzlich befällt, tödtet sie auch geschwinder, innerhalb 14 Tagen; in diesem Falle hingegen dauert sie oft mehrere Wochen fort. Dort, wo das Uebel hitziger Art ist:

A.

befällt es gemeiniglich die gesundesten, stärksten, muntersten Kinder, selten unter 3 Jahren ihres

Alters; schränkt sich gar nicht auf eine gewisse Constitution ein, ob man gleich Exempel hat, daß mehrere Kinder in einer Familie daran gestorben sind; verräth seine Annäherung oft allein in der Ferne, schon 14 Tage vorher, einem aufmerksamen Beobachter durch ein Straucheln, Stolpern auf ebener Erde, durch einen nicht leicht zu beschreibenden besondern Gang des Kindes, wo die Beine nicht gelähmt zu seyn, und so ihren Dienst zu versagen scheinen, sondern das Kind sie hoch aufhebt, und große Schritte damit macht, ohne über sonst etwas kränkliches zu klagen. Dieser Erscheinung (welche vielen Beobachtern entgangen ist, die über diese Krankheit geschrieben haben*), vielleicht weil sie ihre Kranken schon im Bette antrafen, oder nach Verlauf des ersten Zeitraums zu Hülfe gerufen wurden) folgt denn zuerst das wahre Erkranken, der fieberhafte Zustand, mit Kopfweh, das alles keine bestimmte Perio-

*) Ed. Ford hat jedoch einen 9jährigen Knaben gesehen, bey dem man nachher 12 Unzen einer hellen lymphatischen Feuchtigkeit in der Hirnhöhle antraf, der oft stolperte, sich woran festzuhalten versuchte, und zuletzt immer mußte getragen werden.

Perioden hält, aber wohl Exacerbationen des Abends herbeyführet; Erbrechen, jedoch dieses nicht immer, und noch seltner Durst; Unruhe, Schläfrigkeit, die allmählig, innerhalb 4 Tagen, in einen wahren Sopor übergeht, in welchem von Zeit zu Zeit ein lautes durchdringendes, nicht lange fortdauerndes, sondern kurz abgebrochenes Geschrey, als Ausdruck eines lebhaften Schmerzes, bemerkt wird, ohne daß die Kranken die Ursache angeben — selten wird Kopfweh ganz bestimmt genannt, welches bey einigen wieder sich dadurch errathen läßt, daß sie oft mit derselben Hand (da die andre gelähmt, oder zu willkührlichen Bewegungen nicht stark genug scheint) nach dem Kopfe oder nach den Augen greifen, als wenn sie da etwas wegwischen oder entfernen wollten. Werden die Kranken in diesem Zustande von Betäubung oder Schlafsucht durch Rufen, Anfassen rc. aufgeweckt, so sinken sie im Momente des Erwachens schon wieder in Schlaf, und man kann sie nicht lange munter erhalten; sie antworten zwar treffend und richtig, aber mit einsylbigen Worten und laconisch; nehmen auch Arzney, Getränk,

was man ihnen bietet, so wie Säuglinge auch die Brust, aber sind sehr verdrießlicher Laune, und lassen sich höchst ungerne durch Einnehmen von Arzney ꝛc. in ihrem Schlummer stöhren; sie sind auch nicht ganz fühllos oder unempfindlich bey Reizen auf der Haut ꝛc. Oeffnen die Kranken in diesem Zustande die Augen, welches selten und nicht lange geschiehet, so findet man den Stern allzeit ungewöhnlich erweitert, zuweilen ein Schielen, immer eine Lichtscheu, oder zuweilen gar völlige Blindheit, die gemeiniglich aber erst später erfolgt, wo sie die Augen beständig offen haben. Liegen die Kranken eine Zeit lang ruhig, so höret man sie oft tief seufzen, oder auch abwechselnd, bald langsam, bald geschwind Athem hohlen. Sie liegen am liebsten horizontal, oder mit dem Kopfe niedrig, und richten sich nie im Bette auf. Ich habe jedoch 1776 ein Kind gesehen, bey dem sich sogleich Neigung zum Erbrechen äußerte, selbst mitten in der Nacht, wenn es ein wenig niedrig mit dem Kopfe oder auf dem Rücken lag. Der Leib ist in diesem Zeitpunkte der Krankheit, und auch später hin so verstopft, daß auch drastische Mit-

tel ohne Wirkung bleiben; erfolgt sie aber, so gehen Excremente und Urin bald unwillkührlich ab. Die alsdann untersuchten Excremente sind immer dunkelgrün, und lassen nichts weniger erwarten, als daß der Sitz der Krankheit in so großer Entfernung von den ersten Wegen zu suchen sey, und führen leicht irre, besonders wenn man etwa auch zugleich nach jenen Arzneyen wirklich Würmer mit abgehen siehet. Nach Verlauf von einigen Tagen geht nun die bisherige Betäubung und Schläfrigkeit in die stärkste Schlafsucht und Unempfindlichkeit über; es verändert sich zugleich der Puls, der bis dahin fieberhaft gewesen war, und wird nicht nur unordentlich, sondern auch weit langsamer als selbst im gesunden Zustande. Diese Langsamkeit des Pulses scheint mir, zugleich in Verbindung mit dem comatösen Zustande, eins der gewissesten Zeichen dieser Krankheit zu seyn.

Bey ganz kleinen, saugenden Kindern ist der Gang darin unterschieden, daß man das laute Geschrey nicht höret, und, obgleich die Veränderung im Auge ꝛc. sichtbar wird, sie doch

sehr

sehr frühe, sogleich die ersten Tage, bey der ersten Anwandlung des Fiebers schon in Convulsionen fallen.

Jene Langsamkeit des Pulses dauert die ganze Krankheit hindurch fort, bis er sie in dem letzten Zeitpunkte der Krankheit — von 8 — 14 Tagen — so sehr wieder verlieret, und an Frequenz zunimt, daß man ihn nun nicht mehr zählen kann. Die Wangen werden abwechselnd dunkelroth; es entsteht ein Zahnknirschen, und wenn nicht allgemeine Convulsionen die Krankheit endigen, so siehet man doch wenigstens partielle in den Gesichtsmuskeln.

Die Dauer der ganzen Krankheit ist, wenn sie auf die eben beschriebene Art erscheinet, kurz, und endigt sich gewöhnlich schon innerhalb 14 Tagen; je kleiner die Kinder aber sind, desto geschwinder (eins von 19 Wochen starb mir schon am 8ten Tage), bey andern wieder in längerer Zeit, besonders bey denen, wo sie nach der obigen Eintheilung vorher der Gestalt eines chronischen Uebels sich nähert.

B.

und etwa ganz entschieden die Kinder nach einem Falle auf den Kopf in diesen Zustand gerathen. Denn hier, wenn die Verletzung, die Erschütterung ꝛc. nicht zu heftig ist, daß sie etwa auf der Stelle sogleich gefährliche Zufälle erregt, entsteht das Uebel so langsam und allmählig, Wochen lang nach jenem Falle, daß die Kranken immer noch umhergehen, etwa blos über ein leichtes Kopfweh klagen, und ihre Munterkeit mit der guten Laune verlieren, so daß man den eigentlichen Anfang nicht genau bestimmen kann. Zuweilen können die Kinder, welches ich jedoch nur in einem einzigen Falle bemerkt habe, gewisse Worte nicht finden: sie stoßen im Sprechen an. Die Zunge bleibt hier, wie in dem erstern Falle, rein und feucht; sie nähern sich allmählig immer mehr dem Bette, wo sie denn allnachgrade auch, jedoch viel später als dort, in den comatösen Zustand gerathen, und nun alle die Zufälle auch hier erscheinen oder mit dem beschriebenen zusammenlaufen, wie in dem ersten Falle. Das durchdringende Geschrey hört man hier auch viel später, oft erst am 7ten Tage, seitdem sie im

Bette liegen. Die Verstopfung wird auch hier so hartnäckig wie dort: 2 Quentchen Jalappen-Pulver, in einem Tage genommen, bleiben oft ohne Wirkung. Bey dem Schielen oder andern Veränderungen im Sehen thränen zuweilen beyde Augen, oder eins, ungewöhnlich. Wo man das laute Geschrey höret, da kann man sicher den Tod prophezeyen, ob er gleich bey den übrigen Zufällen, leider! auch nicht selten ist. Zuletzt endiget sich auch, so wie dort, die Scene gemeiniglich mit Convulsionen.

Was man in beyden Fällen, wenn die Krankheit plötzlich oder langsam entstanden ist, auf der Oberfläche des Körpers noch auszeichnendes entdeckt, ist, da in beiden Fällen die Symptomen sich wieder ähnlich werden, oder zusammenstoßen, in dem schlimmsten letzten Stadio, der weiße Friesel, kleine fast unsichtbare Bläschen (Puncta miliaria), wie Hirsenkörner groß, mit einer durchsichtigen, leicht verdunsteten Feuchtigkeit gefüllt, womit die Stirn, Schläfe, Hals und Brust gleichsam besäet sind, und die nach dem Tode des Kindes noch eine

Zeit

Zeit lang sichtbar bleiben, weil sie aber keinen rothen Grund oder Hof haben, nicht sehr in die Augen fallen, und wahrscheinlich oft übersehen werden oder unbemerkt geblieben sind. Diese Bläschen sind mir das gewisseste Zeichen des nahen Todes. Lange Zeit glaubte ich, diese Entdeckung, die sich nachher bestätigt hat, zuerst und allein (1772) gemacht zu haben, als ich zufällig fand, daß ich diese Ehre mit einem Andern theilen müsse, dessen Schriften jetzt keine Modelecture mehr zu seyn scheinen. Storch sagt ausdrücklich und mit dürren Worten in seinen Kinderkrankheiten, Th. III. S. 130 u. 144: „Wenn bey einem Kinde ein Geschwür im Gehirne vermuthet wird, so ist dieser (weiße) Friesel gewiß damit verknüpft.“

Ungeachtet der vielen hier angegebenen Merkmale von der Gegenwart der wässerigten Feuchtigkeit in den Hirnhöhlen würde ich mich nicht unterstehen, ein einziges derselben für so zuverlässig oder unzertrennlich anzugeben, daß man es pathognomonisch nennen dürfte. Dergleichen haben wir, leider! nur bey sehr wenigen

Krankheiten, und selbst diejenigen, worauf man sich hier etwa noch am meisten verlassen könnte, hat Withering alle sehr verdächtig gemacht. Unwidersprechlich ist es auch, und in der Erfahrung gegründet, daß einige der beschriebenen Symptome, wenn man sie einzeln aus der Verbindung mit den übrigen heraushebt, sich ebenfalls da finden, wo die Krankheit nicht idiopathisch im Kopfe, sondern im Unterleibe rc. ihren Sitz hat. Aber der forschende Arzt sucht immer mehrere auf, und aus diesen zusammengenommen, aus der Combination, wagt er denn erst einen Schluß zu machen; wenn er dabey Analogie zu Hülfe genommen, genügt ihm oft schon die Wahrscheinlichkeit, da er weiß, daß er es überhaupt nie, oder sehr selten mit der größten Genauigkeit und Sorgfalt zur mathematischen Gewißheit bringen kann.

Wenn man aus allen den beschriebenen Zufällen und Phänomenen zusammengenommen (nur sind sie unglücklicherweise nicht immer in der Ordnung und alle zusammen) auch nicht immer auf ein Extravasat, besonders der wässerigten Feuch-

tig-

tigkeit in den Gehirnhöhlen selbst, mit anatomischer Genauigkeit schließen kann, so sind sie doch wenigstens höchst wahrscheinliche Beweise, daß ein ähnlicher Fehler im Gehirne selbst die Ursache derselben sey, wenn es auch nur eine Taenia hydatigena wäre, die ich jedoch nur ein einzigesmal (1771) mit ihrer Blase, einer guten Erbse groß, zugleich bey andern Fehlern des Gehirns angetroffen habe.

Man hat auch wirklich Sectionen genug, wo nach jenen Zufällen das Wasser nicht in den Hirnhöhlen, sondern andere große organische Fehler unter dem Hirnschädel sind entdeckt worden; Quecksilber also (so sehr verdächtig auch Warren den Gebrauch desselben zu machen sucht, und bey dem bekannten glücklichen Erfolge zweifelt, ob man nicht eine andere Krankheit für Hirnwassersucht angesehen habe) auch da wenigstens nicht geschadet haben würde, da man vielmehr nach Dobsons und vieler Andern Beobachtungen sichtbaren Nutzen davon erfahren hatte. Der praktische Arzt ist sehr glücklich, wenn er bey einer versteckten Krankheit, die aus 2 verschie-

schiedenen Ursachen entstehen kann, ein Mitte kennt, und zu wählen weiß, das er wider beide zugleich mit Sicherheit anwenden darf, und dadurch er bey der einen möglichen Ursache wenigstens nicht schadet, indem er der andern damit begegnet.

§. 95.

Wenn ich eine hitzige und chronische Art dieser Krankheit nach meiner eignen Erfahrung angenommen, so sehe ich, daß andre Beobachter den so unterschiednen Gang auch schon bemerkt haben, Quin, Rand, Bader rc. Einige machen sogar einen Unterschied nach dem Sitze des Wassers, und nennen innern Wasserkopf, wenn es zwischen dem Hirnschädel und den Hirnhäuten austritt, zuweilen die Figur des Kopfs und der Suturen verändert; Hirnwassersucht aber, wo es allein in den Hirnhöhlen sich zeigt. Große Zergliederer wollen jedoch zweifeln (Baillie, Sömmerring), ob zwischen den festen Hirnhäuten und dem Schädel sich Wasser sammeln könne; sie mögen es mit jenen ausmachen! Hier ist, wie man leicht siehet, blos die

die Rede von der wässerigten hellen Feuchtigkeit, welche sich in den ventriculis cerebri, besonders lateralibus, anhäufet, und da ist es mir wahrscheinlich, daß bey der unter A. beschriebenen hitzigen Art dieser Krankheit die allgemeine Ursache eines jeden wassersüchtigen Zustandes Statt habe, nämlich vermehrte Ausdünstung, und zugleich verringerte, oder nicht verhältnißmäßige Resorption der Flüssigkeit; bey der allmähligen (B.) langsamen Anwandlung der Krankheit aber ein vor einiger Zeit zerrissenes lymphatisches Gefäß die Quelle des nachher immer in größerer Menge sich anhäufenden, und durch seinen Druck wirkenden Wassers geworden sey, als welches letztere, wie ich sehe, auch andre annehmen, und die Verschiedenheit in der ersten Entstehung am leichtesten erkläret. Diese Erklärung schließt dabey andre Ursachen der Krankheit nicht aus, welche zu der Ansammlung des Wassers Anlaß geben können.

§. 96.

Wenn ein so großer erfahrner Arzt als J. Fothergill, wie ich oben bemerklich gemacht,

macht, sogar freimüthig gestehet, daß er sich selbst geirret, und 2—3 Kranke, welche er mit der Hirnwassersucht behaftet geglaubt, bloß mit anthelmintischen Mitteln hergestellt, indem er sie von Würmern befreiet habe, so muß es für einen weniger geübten wol ungleich schwerer seyn, Wurmkrankheit von Hirnwassersucht zu unterscheiden, oder — anthelmintische Mittel müssen auch vielleicht zugleich auf diese Krankheit anwendbar werden, und so jenen nur anscheinenden Irrthum von Fothergill entschuldigen. Es stimmen jedoch mehrere Beobachter darin überein, daß die Zufälle in beyden eine große Aehnlichkeit unter einander haben. Da also eine Täuschung in der Diagnostik hier sehr leicht seyn muß, so scheint es mir nothwendig, sie hier neben einander zu stellen, die verschiedenen Phänomene mit einander zu vergleichen, und zuletzt ihren Unterschied zu zeigen. Es würde mir inzwischen die größte Mühe machen, von einer eigentlich sogenannten Wurmkrankheit, welche sich immer auf dieselbe Art, in derselben Gestalt dem Beobachter darbietet, ganz unabhängig von einer andern, allein von Würmern

ent-

entstände, und einen gewissen gleichförmigen Carakter hätte, hier die Zeichnung zu liefern, so wie ich sie in diesem Werke von andern Krankheiten entworfen habe. Denn ich scheue mich nicht, hier offenherzig mein Glaubensbekenntniß darüber abzulegen, daß es dergleichen gar nicht, oder in höchst seltnen Fällen, giebt, wo nicht so wohl Würmer, als vielmehr Insecten oder ihre Larven zu außerordentlichen Auftritten Anlaß geben, davon man in den neuesten Zeiten einige merkwürdige Exem... hat. Ich habe hier auch genaue Beobachter auf meiner Seite, welche sich eben so wenig von der Wirklichkeit eines eigentlichen Wurmfiebers, das ganz allein für sich bestünde, und eine ursprüngliche Krankheit ausmachte, überzeugen können, und den wirklichen Abgang der Würmer mehr für Folge als Ursache des Fiebers ansehen. In der That siebet man sie auch bey Krankheiten mit Fieber verbunden abgehen, die sie gewiß nicht verursacht haben, Blattern, Ruhren ꝛc., ob sie gleich in der einen Epidemie häufiger als in der andern seyn können. [Ich rede hier immer von den 3 gewöhnlichen Arten, welche, von Alexander Tralliarus

rus bis auf Röderers Entdeckung der Trichuriden, fast allen Aerzten als die einzigen bekannt waren, und die auch noch immer vor allen den vielen, womit man in den neuern Zeiten die Helminthologie bereichert hat, eine vorzügliche Ausmerksamkeit verdienen. Wenigstens finde ich nicht, daß irgend ein Beobachter einem Cucullano, einem Echinorhyncho und andern neu entdeckten einen Vorwurf gemacht, oder sie als Ursache einer Krankheit angegeben hätte.]

Ich sehe mich also genöthigt, anstatt einer Beschreibung einer eigentlichen Wurmkrankheit, die ich mit der Hirnwassersucht zusammenstellen könnte, blos diejenigen Beschwerden und Zufälle, welche man gewöhnlich den Würmern zuschreibt, aufzufassen, und sie mit denen bey der Hirnwassersucht zu vergleichen, nachdem ich vorher einige allgemeine Reflexionen über Intestinal-Würmer beygebracht, die die Diagnostik vielleicht aufklären können.

Ich mögte nun freylich nicht gern so weit gehen, daß ich mit Rush glaubte, es würden oft grade deswegen Kinder krank, weil sie keine

Wür-

Würmer haben, sondern ich halte sie für eine sehr entbehrliche Wohlthat; aber gewiß verdienen die Würmer doch mehr Toleranz, als man ihnen gewöhnlich wiederfahren läßt, und sind oft eben so unschuldig als andere Dinge, die man bey versteckten Kinderkrankheiten gerne zum Vorwande gebraucht. Man hat ihre Unschuld in den neuern Zeiten auch schon immer mehr anerkannt, und Einige halten sie gar nicht für eine Krankheit, wenn sie auch von ihrer Existenz bey Kranken überzeugt sind. Ihre Unschuld ist noch gewisser durch Sectionen erwiesen, wo man sie sicher anzutreffen glaubte, und keine fand. Musgrave erzählt in seinem essay on the nature and cure of the socalled worm-fever. Lond. 1776. p. 4: der große Zergliederer Hunter habe ihn versichert, daß er viele Kinder secirt, die am Wurmfieber gestorben seyn sollten, wo er nicht nur keine Würmer gefunden, sondern offenbare Beweise, daß die Krankheit von ganz unterschiedener Art gewesen sey. Und welchem praktischen Arzte sind solche Exempel selten? Der gemeine Mann kann sich nur, wo er sich Würmer denkt, nicht leicht des

Ge-

Gedankens erwehren, daß da genagt oder zerstöhret werde, oder auch immer eine gewisse Fäulniß Statt habe, wie man sie in todten Körpern, bey alten animalischen oder vegetabilischen Substanzen antrifft. Es ist ihm unbekannt, daß hier Verderbniß oder Fäulniß die Ursache ist, welche jene Geschöpfe herbeylocket, die von den Intestinal-Würmern ganz unterschieden, und fast immer Larven oder die Brut von Insecten sind, und sich allerdings auch zuweilen selbst im lebendigen Körper, in alten Geschwüren rc., die nicht von Insecten rein gehalten werden, erzeugen können; da hingegen die Intestinal-Würmer, bey ihrem großen Vorrathe und Ueberflusse von Nahrung, keines Nagens, Anfressens oder Zerstöhrens bedürfen.

Bey einer jeden, ein wenig lange daurenden versteckten Kinderkrankheit siehet man nicht nur den Layen, sondern selbst den Arzt den Verdacht oft auf Intestinal-Würmer werfen, und diese daher in den Sterbelisten, so wie Zahnarbeit und Convulsionen, die stärkste Rubrik ausmachen. Seitdem man sich aber mit genauerer

Un-

Untersuchung der Hirnwassersucht beschäftiget, und wir so lehrreiche Beschreibungen davon besitzen, scheinen diese Würmer auch deswegen ein wenig in Vergessenheit zu gerathen, und die erfahrensten Kinderärzte darin mit einander übereinzustimmen, daß die Hirnwassersucht wirklich weit öfter vorkomme, als man bisher geglaubt, und daß man bey großen versteckten Kinderkrankheiten mehr an diese, als an Würmer, zu denken Ursache habe; zumal da viele Zufälle, welche man vormals auf Rechnung der Würmer setzte, den bey der Hirnwassersucht oder einem andern idiopathischen Uebel des Kopfs weit mehr ähneln. Wo Würmer bey andern Krankheiten mit von der Parthie sind, da spielen sie freylich eine nicht ganz unbedeutende Rolle, und können durch die von ihnen erregten neuen außerwesentlichen Zufälle die Diagnostik erschweren; aber selten hat man Ursache, so lange sie sich ruhig verhalten, und keine schmerzhafte Beschwerden offenbar erregen, an ihre Entfernung allein zu denken.

Da fast kein Fach der Naturgeschichte in den neuern Zeiten so große Aufklärung erhalten hat,

hat, als die Helminthologie, besonders durch deutsche Naturforscher, so hat wahrscheinlich diese dazu beygetragen, daß auch in dem pathologischen Theile der Helminthologie — wenn ich es so nennen darf, in der belebten Pathologie — größere Fortschritte gemacht sind; daß man bey dieser Gelegenheit der mikroskopischen Untersuchung auf wirkliche Krankheiten gerathen ist, und jetzt weiß, was z. E. die Finnen bey Schweinen, die Krätze, die Franzosenkrankheit der Haasen und des Rindviehes ꝛc. für einen Ursprung haben, und J. P. Frank ausruft: Ignotum forte mundum aliquando in pelle humana, quis deteget. Lib. IV. p. 220.

Ohne Zweifel hält man auch deswegen nun die Intestinal-Würmer bey Menschen nicht mehr für so furchtbar als ehedem, seitdem man entdeckt hat, daß so viele Menschen, so viele im Wasser, in der Erde, in der Luft lebende Thiere, Würmer verschiedener Art bey sich führen, daß sie beynahe da zu Hause zu gehören scheinen, und ohne daß man diese Geschöpfe davon besonders leiden siehet. Selbst der bey uns häufige, fürch-

terlich scheinende, ellenlange Kettenwurm oder Bandwurm erregt nicht einmal große Zufälle, wohnet oft ganze Jahre lang in der größten Stille und Einsamkeit (obgleich nicht immer ohne Gesellschaft) in den Gedärmen, ohne daß er unangenehme oder gar gefährliche Beweise seiner Existenz gäbe (ob ich ihn gleich auch schon bey einem 2jährigen Kinde angetroffen); höchstens erregt er plötzlich eine Art Ohnmacht, einen Druck im Leibe, oder Beschwerden, die an hysterische grenzen, leicht und bald vorübergehen, und verdienet allerdings auch bey solchen vorkommenden Fällen, daß man sich seiner erinnere, und ihn nicht ganz aus den Augen verliere; Convulsionen habe ich aber nie von ihm entstehen sehen. Freylich mogte er in denen Zeiten, als man ihn und den Pfriemenschwanz sehr künstlich mit Hörnern, Augen und Ohren, auf eine empörende Weise abbildete (und dies ist noch nicht sehr lange), da man ihm lieber mit Linne' hätte allen Kopf absprechen sollen, auch wohl verhältnißmäßig getreue und glaubwürdige Beobachtungen von fürchterlichen Auftritten veranlassen. Die durch Goeze, Zeder ꝛc. uns verschaffte nähere

Be:

Bekanntschaft mit demselben, und seiner fürchterlich schönen Hakenkrone, hat uns mehr beruhiget als erschreckt.

Noch in diesem Jahre trieb ich einer Person einen Bandwurm (Taenia solium) ab, der beynahe ein 12-Unzen-Glas ausfüllte, und gewiß 30 Ellen lang seyn mogte, so daß er mich nicht weiter an die Möglichkeit eines Ueberbleibsels in den Gedärmen denken ließ, und ich ihn meinen Freunden von der Fakultät als ein merkwürdiges Siegeszeichen zeigte. Ein 6 Wochen nachher wiederholter Versuch, die Nichtexistenz desselben noch gewisser zu beweisen, brachte aber eine eben so ungeheure Menge dieses Wurms weg; ja, was vielleicht unglaublich scheinen mag, zum dritten Male kam eine beynahe eben so große Menge zum Vorschein, die aber nun, bey schärfer Untersuchung, zugleich das Kopf-Ende von mehrern Bandwürmern enthielt, also den ganzen interessanten Fall gut erklärte, und die Benennung: solitaire, als irrig zugleich bewies. Bey der erschrecklichen und erstaunenden Menge war dennoch diese Person, sehr geringe seltne

Beschwerden im Leibe ausgenommen, nichts weniger als bettlägerig, sondern vollkommen gesund, blühend und stark.

Mehr noch haben die Kinder wirklich von dem sogenannten Spulwurm (Ascaris lumbricoid.) zuweilen zu leiden und zu befürchten. Er erregt nicht nur zuweilen unleugbar allein, ohne alle andere Ursache, Convulsionen, sondern verräth auch schon seinen Reiz durch die erweiterte Pupille des Kindes, und verdient eben so wohl Aufmerksamkeit als der Madenwurm oder Pfriemenschwanz (Ascaris vermicular.). Obgleich von diesem auch Heberden a. a. O. weiß, daß ihn Jemand das ganze Leben hindurch ohne Beschwerde bey sich haben könne, so habe ich doch von beyden bey Erwachsenen lange daurende Epilepsien entstehen sehen, und bey Kindern weiblichen Geschlechts habe ich den Grund von der so fürchterlich beschriebenen Onanie eben so oft in dem Reize von diesen Ascariden gefunden, die aus dem Mastdarme, ihrem gewöhnlichen Wohnorte, nach der Vagina herumgeschlichen waren, als in einem moralischen Verderben, wo

also auch alle moralische Hülfe und Zwangsmittel der Pardagogen weniger nutzen mußten, als — Injectionen.

Man darf daher das nicht alles leugnen, was man diesen Würmern zur Last legt, und sie nicht immer bey Krankheiten als unbedeutend übersehen, oder für ganz unschuldig halten; nur nicht bey einer jeden versteckten Krankheit von Kindern allein d i e s e Ursache annehmen, ohne eine andere aufzusuchen. Es ist aber schwer, eine zusammenhängende Geschichte aller Zufälle zu erzählen, die von Würmern entstehen sollen, wie ich schon oben sogleich erinnert habe; und wenn man gleich weiß, daß dennoch sehr gelehrte Aerzte ganze Epidemien, als von Würmern entstehend, beschrieben haben, die zum Muster bey einer Geschichte von Wurmkrankheit dienen könnten, so muß man doch bald bemerken, daß, sobald einmal der Beobachter von der Idee ausgeht, in seiner Epidemie entstehe alles von Würmern, die Illusion alsdann leicht so stark wird, daß er auch sogar Mineral-Säuren rc., wonach sich das Fieber verringerte, für anthelmintisch, wie

v. d.

v. d. Bosch, ansiehet, selbst wenn keine Würmer bey dem Gebrauche derselben abgehen *).

Röderer und Wagler fanden in ihrer Göttingischen Epidemie vom morbo mucoso unzählig viele Trichuriden; aber sie nannten sie nicht eine Wurm-Epidemie. In der Epidemie von Kriebelkrankheit im Cellischen, 1770, sahen wir nicht leicht einen Kranken, der nicht Würmer von sich gebracht hätte, und auf ihren Abgang erleichtert worden wäre; aber man nannte sie doch nicht eine Wurm-Epidemie, sondern gab ihr den alten deutschen Namen, weil der zugleich den ganzen Caracter derselben kenntlich macht, wodurch sie sich von allen, auch den ähnlichsten, sogleich unterscheidet, und den schönen griechischen Namens Arthritis, Pemphigus ꝛc. in Caracterisirung der Krankheit gleich kommt. Die Wür-

*) Ueber die Wurm-Epidemien der vorigen Zeiten, welche uns bey Bonetus ꝛc. so fürchterlich beschrieben werden, daß sie Tausenden das Leben gekostet haben sollen, verdienen die wichtigen Gründe erwogen zu werden, wodurch de Haen in seinem gelehrten Werke: Ratio med. XIV. cap. IV. sie verdächtig macht.

mer können allerdings, wie ich schon zugegeben habe, bey einer solchen Gelegenheit alsdann durch einen accessorischen Reiz den ganzen Zustand verschlimmern, aber man darf sie nicht deswegen sogleich für die einzig ursprüngliche Krankheit und einzige Ursache aller Zufälle, sondern höchstens für die coexistirende ansehen.

Gar zu leicht nimt man aber etwas für Wirkung an, das Ursache ist, so auch bey Würmern. Es ist auch z. E. nichts gewöhnlicher, als daß bey einem eingeklemmten, in Brand übergehenden, und doch nicht immer tödtlichen Bruche, wie ich selbst auch gesehen habe, ein Spuhlwurm die große Heerstraße herunterkommt, und sich in der äußern Wunde mit den Excrementen zeigt. Sollte man nun wohl glauben, daß ein Wurm sogar zu einer solchen Wunde Anlaß geben könne? und doch findet man mit diesem Glauben solche Beobachtungen aufgezeichnet*)!! Wahrscheinlich gehöret das, was man von Lumbricis effractoribus erzählet, auch hierher und unter die pathologischen Fabeln, dergleichen es

*) Moehring histor. med. Amst. 1739. p. 179.

es ehedem so viele gab. Ich habe ganz runde Löcher in den Gedärmen alter Leute gefunden, bey denen man in ihrer Lebzeit so wenig als nach ihrem Tode eine Spur von Würmern entdeckte. Und Bianchi sagt schon sehr treffend, daß die gewöhnlichen Würmer sich keine Oeffnung machen, sondern die gemachten nutzen, besonders in den Gedärmen, da sie kein Vermögen oder Werkzeug besitzen, die Gedärme zu zerfressen rc. de naturali in hum. corpore vitiosa morbosaque generatione. Aug. Taurin. 1741. p. 353 seq.

Bey Nervenkrankheiten der Kinder, ohne Fieber, sind die Würmer (ich rede immer von der gemeinsten Art, dem Spuhlwurme und Pfriemenschwanze) unleugbar nicht ganz unschuldig; sie sind es auch nicht einmal, wie ich oben schon erinnert habe, bey Epilepsien Erwachsener, und ehe man in diesem Falle irgend ein sogenanntes specifisches Mittel versucht, Nervenschwäche oder ein idiopathisches Uebel im Kopfe bestreiten will, ist es doch oft ein Glück, wenn einem die Vermition einfällt, und man durch anthelmintische

tische Mittel sich wenigstens den Weg zur Cur bahnet. Ueberhaupt: wenn man die Würmer einen Antheil an Krankheiten nehmen läßt, so ist er immer mehr bey convulsivischen Zufällen*) als bey andern chronischen Krankheiten wahrscheinlicher; letztere haben gemeiniglich eine tiefer liegende Ursache, die nicht durch die gewöhnlichen anthelmintischen Mittel gehoben wird, selbst wenn Würmer abgehen. Man findet sie, wie gesagt, oft da nicht, wo man sie vermuthet hatte, und man findet sie eben so oft da, wo man sie nicht erwartet hatte: so sehr trüglich sind die Zeichen von ihrer Gegenwart im Magen und in den Gedärmen. Unter andern auch das so allgemein als caracteristisch angenommene Jucken der Nase, das ungleich öfter einen Fehler im Drüsen-System anzeigt. Von einem Wurmschleime, wovon

*) Nur kann ich mich nicht überzeugen, daß sie auch den Trismus traumaticus verursachen, wie man in ganzem Ernste noch zu unsern Zeiten, im 5ten Jahre der französischen Republik, behauptet hat (Laurent mémoire clinique sur le Tétanos chez les blessés. à Strasb. pag. 20); denn ich habe selbst Manchen an diesem Zufalle leiden sehen, ohne jemals von Würmern etwas zu entdecken.

von man so oft höret und lieset, erwähne ich nichts, weil ich keinen Begriff davon habe, wie man den von anderm Schleime unterscheidet, und uns noch Niemand eine besondre Beschreibung davon gegeben oder darüber belehret hat.

Merkwürdig scheint es, daß von der Stelle, welche ein solcher Wurm einnimt, so vieles abhänget; denn wenn gleich der Kettenwurm ganze Jahre ohne Nachtheil für die Gesundheit im Unterleibe sich aufhalten kann, so erregt dagegen ein ungleich kleinerer Spuhlwurm im Magen oft die schrecklichsten Zufälle, die man nicht zu erklären wußte, und wobey man an einen Wurm gar nicht dachte. Auch glaube ich bemerkt zu haben, daß es nicht einerley sey, in welchem Theile des Canals von Gedärmen ein Wurm sich aufhalte — so wie es der Fall mit Blähungen und Excrementen auch ist.

Aber doch sind alle diese Zufälle, welche man wirklich von Würmern entstehen siehet, oder von ihnen herleitet, so wenig zusammenhängend, und in der Ordnung, daß sie mir mit denen bey der Hirnwassersucht nur eine sehr entfernte Aehn-

lichkeit zu haben geschienen, und ich die sogenannte Vermition auch nicht neben der Hirnwassersucht aufgestellt hätte, wenn nicht so viele Schriftsteller glaubten, diese Aehnlichkeit gefunden, und besonders der ehrliche Fothergill bedauerte, beyde mit einander wirklich verwechselt zu haben.

§. 97.

Es wird wahrscheinlich den Lesern selbst ein wenig schwer werden, wenn sie die über die Würmer so eben hingeworfenen zerstreueten Gedanken mit der vorhergehenden Beschreibung der Hirnwassersucht vergleichen, eine große Aehnlichkeit unter beyden aufzufinden. Um den großen Abstand und Unterschied noch deutlicher zu machen, füge ich noch folgendes bey.

1) Bey der Hirnwassersucht dauren die oben beschriebenen Zufälle ununterbrochen eine Zeit lang fort, besonders der schlafsüchtige Zustand und das Kopfweh, welches einige Kranke bestimmt mit Worten angeben, andere durch ihr durchdringendes Geschrey und öfteres Hingreifen nach dem Kopfe pantomimisch ausdrücken; dieses

ses siehet man da, wo man Würmer allein im Verdacht hat, in so langer Fortdauer nicht.

2) Bey der stärksten Vermuthung von Würmern gibt es gute Zwischenzeiten von Wochen, Monaten, und in denselben klagen die Kinder von Zeit zu Zeit, auch vorher, ganz bestimmt über Leibweh; haben einen aufgetriebenen Bauch, wie bey Vergrößerung der mesenterischen Drüsen; bey der Hirnwassersucht niemals, wenigstens nicht, wenn nicht etwa zu derselben Zeit eine Complication Statt findet, oder etwas dieses Leibweh veranlaßt, das mit der Hirnwassersucht gar nicht zusammenhängt.

3) Die etwanigen Convulsionen von Würmern befallen gemeiniglich den Kranken plötzlich; bey der Hirnwassersucht debutirt das Kind niemals mit Convulsionen, sondern diese treten erst nach vorhergehendem fieberhaften Zustande, und im Laufe der Krankheit, hinzu; dort sind sie gemeiniglich transitorisch, hier aber hören sie vor dem Tode nicht wieder auf, und es ist ein äußerst seltner Fall, daß ein Kind, ohne alle andre Krankheit, bloß von Würmern tödtliche

Con-

Convulsionen bekommt, wie man durch die Leichenöffnung wird bestätiget finden. Diese von Würmern entstehenden und plötzlich den Kranken niederwerfenden Convulsionen siehet man auch bey Erwachsenen als Epilepsie, ohne daß sie sich vorher, wie bey der Hirnwassersucht, ankündigten, und ohne nachher eine fortdauernde Krankheit von einigen Wochen auszumachen, sondern die Kranken sind bald darauf wieder im Stande umherzugehen, und bleiben oft ganze Wochen oder Monate davon befreiet.

4) Die Würmer verrathen sich freylich auch zuweilen durch den erweiterten Augenstern der Kranken, hindern sie aber nicht, dabey außer Bette zu bleiben, oder sie veranlassen keine Lichtschen, wie bey der Hirnwassersucht, wo die Kranken zugleich im Bette zu bleiben genöthigt sind, dabey betäubt darnieder liegen, von Zeit zu Zeit braunrothe Wangen, und den außerordentlich langsamen Puls haben, den man da, wo Würmer Verdacht erregen, niemals, oder höchstens intermittirend, findet.

5) Wenn auch bey dem innern Wasserkopfe sich anfänglich neben dem Fieber ein Erbrechen

äußert,

äußert, das den Gedanken von Anhäufung irgend einer Unreinigkeit ꝛc. in den ersten Wegen herbeyführen könnte, bleibt die Zunge doch rein und feucht; bey der langen Gegenwart von Würmern wird sie bald schmutzig.

6) Die so sehr hartnäckige, und selbst starken Purgirmitteln nicht weichende Leibesverstopfung findet man nicht bey der von Würmern allenfalls entstehenden etwa ähnlichen Krankheit; vielmehr ist ein chronischer, selbst ohne Leibweh fortdaurender Durchfall bey Kindern eins der zuverlässigsten Zeichen von Würmern, das man noch hat, und nicht so trüglich als

7) das Jucken und der Reiz in der Nase, den das Kind immer entfernen will. Bey der Hirnwassersucht greift es ohnehin mit der einen Hand mehr oben nach dem Kopfe, höher, oder nach den Augen, und ist oft an der andern Seite gelähmt.

8) Das Straucheln, der sonderbare Tritt des Kindes, und die oben beschriebene Veränderung im Gehen, kurze Zeit vor dem Ausbruche

der

der Zufälle bey der Hirnwassersucht, zeigt sich nie bey Würmern allein, ob es gleich dort freylich auch nicht ein beständiger Vorbote ist.

9) Die beschriebenen Frieselbläschen auf der Brust, am Halse rc. sahe ich nur allein hier.

§. 98.

Interessant und eben so dringend scheint mir die Untersuchung zu seyn, wie und worin das sogenannte Todtenfieber mit der Hirnwassersucht übereinkomme, und davon unterschieden sey, — ein Einfall, worauf ich beynahe stolz seyn sollte, da ich bey keinem, selbst der neuesten, Beobachter finde, daß sie bey der so schweren Diagnosis der Hirnwassersucht darauf verfallen wären, diese Vergleichung anzustellen, oder nur an die Möglichkeit dieser Verwechselung zu denken. Und doch werden höchst wahrscheinlich diese beyden Krankheiten weit öfter mit einander verwechselt, und haben eine größre Aehnlichkeit mit einander, als mit den Zufällen, welche man von Würmern herleitet. Die Sache verdient also die größte Aufmerksamkeit; denn bey einer reinen

simplen

simplen Hirnwassersucht mögte wol das bey Todtenfiebern specifische Mittel nicht große Wirkung thun, und, umgekehrt, bey diesen Fiebern alles das unnütz werden, wovon man bey der Hirnwassersucht doch noch zuweilen Nutzen erfährt.

Wenn Jemand dieses Fieber als eine Hirnwassersucht angesehen und behandelt hätte, zumal bey einem Erwachsenen, und zu seiner Rechtfertigung einige Unzen Wasser anführte, die er nach dem Tode in den Gehirnhöhlen gefunden, so würde dies doch kein Beweis seyn, daß jenes ausgetretene Wasser die ursprüngliche Ursache gewesen, die zu allen den gewöhnlichen Zufällen von Schlafsucht, Kopfweh rc. Anlaß gegeben; am wenigsten würde dies Extravasat etwas beweisen, wenn bey der Oeffnung sonst nichts im ganzen Körper als der Kopf untersucht worden, sondern jene Anhäufung des Wassers ist alsdann weit wahrscheinlicher die Folge dieses Fiebers gewesen. Denn warum sollte nach einem solchen Fieber nicht eben sowohl in die Gehirnhöhlen sich dergleichen ergießen, als es bey andern lange dauernden intermittirenden, besonders den gemei-

meiniglich so hartnäckigen 4tägigen, sehr gewöhnlich in andre Höhlen und in das Zellengewebe geschiehet? Wir finden ja auch wirklich Exempel aufgezeichnet, wo die Zufälle in der angeblichen Hirnwassersucht beynahe so periodisch, als bey einem Fieber dieser Art gewesen sind, und man sich nicht von der Idee losmachen kann, beyde seyen mit einander verwechselt worden, da ohnehin die Zufälle hier eine weit größere Aehnlichkeit mit einander haben, als bey der von Würmern entstehenden. Ich habe daher geglaubt, hier beyde neben einander stellen zu müssen, um die Leser zu der größten Aufmerksamkeit darauf zu reizen. Ich darf jedoch hier nicht erst jenes sogenannte Todtenfieber (febris intermittens soporosa) weitläuftig beschreiben, und das Bild in völliger Größe hier aufstellen, sondern muß seine Form und Zufälle als bekannt annehmen, oder auf die classischen Schriftsteller verweisen, welche uns dasselbe so beschrieben haben, Torti, Werlhof ꝛc., daß es nicht wohl zu verkennen ist. Vielleicht werden die Leser mehr überzeugt, wenn ich aus Krankengeschichten sie selbst urtheilen lasse, ob nicht eine Verwechselung

des-

desselben mit der Hirnwassersucht Statt gehabt haben könne.

Ein angesehener englischer Arzt, Letsom, erzählt unter der Rubrik von Hirnwassersucht die Geschichte eines Mannes von 28 Jahren (Memoirs of the medical society of London 1787. Vol. I. p. 173), welcher lange Zeit über Schwere und Schmerzen im Kopfe und in den Augen geklagt hatte. Diese Empfindung wurde von Zeit zu Zeit stärker und schwächer. Wenn sie am stärksten war, so fiel im Gehen des Kranken eine Veränderung vor: er konnte alsdann nicht grade gehen, sondern stolperte wie ein Betrunkener. Dies alles kam freylich in ganz genau bestimmten Perioden nicht wieder, auch nicht mit sichtbarem Frost ꝛc., sondern nahm allmählig von Zeit zu Zeit wieder zu, da denn der Kranke zu Bette eilen, oder sich auch außerhalb desselben rückwärts gebeugt halten mußte, um sich zu erleichtern. Die Dauer dieser Anfälle war ungleich, zuweilen einen Tag, eine Nacht, oft länger, und sie ließen alsdann auch so allmählig wieder nach, wie ihre Anwand-

lung

lung erfolgt war. Der Stern im Auge war bey diesen Umständen beständig erweitert. In den Anfällen hatte der Kranke eine merkliche Hitze, einen profusen Schweiß, holte geschwind Athem. Zwischen den Anfällen gab es solche gute Zwischenzeiten, daß er an gesellschaftlichen Freuden und der Conversation Antheil nehmen konnte, mit gutem Appetit aß, und aufrecht saß, obgleich immer bey finsterm Ansehn. Alles dauerte einige Monate, da jene guten Zwischenzeiten immer kürzer wurden, und er unterliegen mußte. Durch den von Zeit zu Zeit so sichtbaren Nachlaß der Zufälle wurde Letsom selbst einmal auf die Idee von intermittirendem Fieber geleitet, und gab Fieberrinde (NB. bey der hartnäckigen Verstopfung mußten aber oft mehrere Tage abführende Mittel gebraucht werden, und es wurde also die Rinde ausgesetzt!), die dem Kranken auch so gut bekam, daß sie ihm selbst unentbehrlich schien, und er sie immer vor dem Bette zu haben wünschte. — Die Hirnhöhlen enthielten 6 Unzen klares Wasser.

Ist dieses der Gang einer wahren caracterisirten Hirnwassersucht? Kann man das so nennen,

wenn

wenn der Kranke ganze Monate damit zubringet, nebenher so gesunden Appetit zum Essen als Verstand hat, und die Zwischenzeiten, Remissionen oder Intermissionen so deutlich sind? ohne alle Betäubung, Schlafsucht, oder andere Zeichen eines Druckes auf dem Gehirn? Ist denn jeder Druck oder Schwere im Kopfe so selten consensualisch aus dem Unterleibe entstanden, und hat immer den Grund im Kopfe selbst? Muß man nicht vielmehr von 50 Fällen dieser Art 49 vom Gegentheile annehmen, und die Ursache vom Kopfweh rc. in großer Entfernung vom Kopfe, und vorzüglich unter dem Zwerchfelle, suchen? Ist es einem erfahrnen Arzte etwas ungewöhnliches, ein periodisches Kopfweh oder eine Migraine zu sehen, dabey wirklich auch sogar im Sehen eine Veränderung vorgeht, der Leidende, kurz vor der Anwandlung des Kopfwehs, die Objecte schief oder doppelt siehet? Mir wenigstens ist es so ungewöhnlich nicht, und der Unerfahrne kann allenfalls bloß bey Medicus, schon in seiner Geschichte periodischer Krankheiten, viele solcher Fälle gesammlet finden.

Wenn man gleich, nach Letsoms Versicherung, nichts in der Leiche seines Kranken fand, als das Wasser im Gehirn, so weiß man ja, daß sich bey dem so seltnen Tode nach einem gemeinen intermittirenden Fieber oft noch weniger Ursache des Todes — nicht einmal der Krankheit, findet, als hier, daß aber, wie gesagt, bey solcher Veranlassung sich leicht Wasser irgendwo anhäufet, wenn das Fieber von langer Dauer gewesen ist. Ist also jemals das ausgetretene Wasser Folge, und nicht Ursache, der Krankheit gewesen, so ist es gewiß hier, und wenn die von Letsom erzählte Geschichte auch nicht ein reines soporöses Wechselfieber, sondern ein verstecktes, bezeichnet, so wird es mir doch überhaupt daraus höchst glaublich, daß man nicht allein bey Erwachsenen, wie in dem beschriebenen Falle, sondern auch bey Kindern mehrere dergleichen Exempel sehen müßte, und bey genauem Nachsuchen bey Schriftstellern auch finden würde.

Sectionen von solchen Personen, welche am Todtenfieber gestorben sind, sind bey denen Beobachtern, welche eigends davon geschrieben ha-

haben, sehr selten; aber Cleghorn hat in seiner Epidemie von Wechselfiebern, welche er in Minorca beobachtet, und worunter die soporösen sehr häufig waren, beynahe 100 solcher Leichen geöffnet, und das nicht gefunden, was man bey der simpeln Hirnwassersucht immer findet, das in der Hirnhöhle sich anhäufende viele Wasser, sondern eine große Veränderung im Unterleibe*).

In dem Letsomschen Falle siehet man nun freylich ausgetretenes Wasser im Gehirne angegeben, und dies könnte ein Widerspruch scheinen, wenn ich dessenungeachtet die Krankheit für ein verlarvtes Wechselfieber halte, bey dem man dergleichen nicht zu finden pflegt. Aber zu geschweigen, daß die Länge der Dauer dieser Krankheit sie, wie ich schon gesagt, genug von einem weit geschwinder tödtenden, eigentlich perniciösen Fieber unterscheidet, so war hier das lange daurende Kopfweh das hervorstechende Symptom, wodurch zuletzt der Kopf selbst idiopathisch leiden, und angegriffen werden mußte, so daß daraus

*) Obs. on the epidem. diseases in Minorca. Lond. 1762. p. 165.

die Anhäufung vom Wasser erklärbar wird, die sich bey einem solchen Fieber von kurzer Dauer gewöhnlich sonst nicht findet.

Man darf hier auch nicht vergessen, daß Krankheiten, welche den Typus von intermittirenden Fiebern halten, nicht allein auf Erwachsene eingeschränkt sind; es sind es sogar nicht einmal die perniciösen apoplektischen Fieber selbst. Diese befallen sogar Kinder zuweilen, und können also eben so leicht hinter die Maske vom Wasserkopfe und andern Krankheiten sich verstecken, also auch mit denselben verwechselt werden. Inzwischen muß man sich auch durch die Betäubung und das viele Schlummern, worin die Kinder bey einer jeden großen hitzigen Krankheit so leicht verfallen, nicht sogleich irre machen lassen, wenn man nichts periodisches dabey bemerkt.

Da die bösartigen Wechselfieber oder Todtenfieber so äußerst selten vorkommen, so entgeht in einem solchen Falle (bey einem Kinde noch gewisser) oft die ganze Idee davon dem Beobachter, und er richtet, ganz uneingedenk derselben, allein

allein auf den Kopf des Kindes selbst, auf ein hier liegendes locales Uebel, seine ganze Aufmerksamkeit.

Ich habe schon bey einem 2jährigen Kinde (1789) das apoplektische intermittirende Fieber so sehr genau caracterisirt gesehen, als es nur möglich ist, und Torti von einem kleinen Knaben beschrieben hat, dessen Geschichte ich nachher ausführlich mittheilen werde. Während einer starken Epidemie von kalten Fiebern (1774) sahe ich auch ein 6jähriges Kind, das plötzlich vom Schwindel befallen wurde, in der Stube herumtaumelte, — eine entfernte Aehnlichkeit mit der oben beschriebenen ersten Anwandlung der Hirnwassersucht — einen starren Blick, hatte, nach allen Objecten ängstlich griff, irre redete, endlich niederfiel, und in einen comatösen Zustand von mehrern Stunden gerieth, darauf wieder gesund erwachte und aufstand, am 3ten Tage nachher dieselbe Rolle spielte, und nach 3 solchen Anfällen vorzüglich durch Fieberrinde hergestellt wurde.

Ich schreibe hier, um die auffallende Aehnlichkeit beyder Krankheiten recht anschaulich

zu

zu machen, die Krankheitsgeschichte eines Kindes ab, welche Torti erzählet. (Therapeut. specialis ad febres periodicas perniciosas. Venet. 1732. p. 238.). Wer sie mit meiner obigen Beschreibung der Hirnwassersucht (A) vergleichet, wird vielleicht erstaunen. Das Kind hatte ein doppeltes 3tägiges Fieber, davon sich die Paroxysmen schon berührten, dabey öfteres und starkes Erbrechen vom grünen Wurmschleime, und auch ähnliche Stühle, einen großen Abscheu vor Speisen, ein öfteres und häufiges Nasenbluten. Wie man dieses alles nach der gewöhnlichen Methode behandelt hatte, fiel das Kind in einen sehr tiefen Schlaf, der zur Zeit der Exacerbation des Fiebers eintrat, bis an den Nachlaß desselben fortdauerte, und alle Tage wieder erschien. Der Kranke schien unter der Last dieser Zufälle schon zu erliegen, wurde blaß und gänzlich erschöpft. Wie er auf diese Art in die größte Gefahr gerathen war, und sich sein Gesicht schon so verändert hatte, daß er einem Lebenden fast nicht mehr ähnlich sahe, entschloß sich Torti, ihm die China zu geben, das freylich, da er sie in Substanz anzuwenden

wünsch-

wünschte, große Schwierigkeit machte, aber doch durch die kluge Mischung, und durch das Beybringen der Arzney in Clystieren, einen so glücklichen Erfolg hatte, daß der Knabe, bey dem herzhaften Gebrauche derselben, in wenig Tagen von seinem Fieber, von Würmern, und dem schlafsüchtigen Zustande völlig befreiet wurde.

Wer sich hier aus meiner oben gegebenen Beschreibung (A) der Hirnwassersucht erinnert, daß die erste Anwandlung mit einem Fieber von unbestimmtem Caracter geschiehet, und einige Tage fortdauert, dabey das Kind sogleich ein Erbrechen bekommt, in einen tiefen Schlaf geräth, der setze nun den Fall, daß dieses erste Fieber intermittirender Art sey, und zwar ein doppeltes dreytägiges Fieber, wo Intermission oder Nachlaß so unmerklich ist, daß sie dem Beobachter fast entgeht, da der zweyte Paroxysmus schon anfängt, wo der erste kaum aufgehört hat — (und grade dieser doppelten dreytägigen Fieber hat Torti sehr viele gefunden — die nachher in eine tödtliche Lethargie sich endigten). Das Kind wird alsdann nicht nur immer in der Betäu-

bung,

bung, wie ich es oben beschrieben habe, bleiben, sondern diese allmählig in den folgenden Exacerbationen des Fiebers zunehmen, wie es immer bey den soporösen Fiebern geschiehet, und zuletzt gar keine Spur weiter von einem intermittirenden Fieber zu entdecken seyn. Auch während der deutlichen Intermission, sagt Torti ganz ausdrücklich, dauret der Hang zum Schlafe noch fort. In beyden Fällen, bey Hirnwassersucht und im soporösen Fieber, behalten die Kranken anfänglich immer noch Gefühl, verlieren es aber immer mehr; und alle ihre Sinne, besonders das Gesicht, werden unempfindlich.

Wer sich dieses sehr lebhaft vorstellt, der wird nicht leicht zweifeln, daß es unglaublich nöthig sey, nur mit der größten Behutsamkeit im Anfange, wo die Intermission nicht bald merklich wird, über die Natur der Krankheit zu entscheiden, und wird gestehen, daß es eben so leicht möglich sey, die Hirnwassersucht mit der Art von perniciösen Fiebern zu verwechseln, welche man soporöse nennt, und wo die Lethargie das hervorstechende Symptom ausmacht; denn

bey

bey den übrigen Arten derselben sind die Symptome weit abstechender; und von einer fürchterlichen Cardialgie, von einem kalten Schweiße, von der Marmorkälte rc., welche das Todtenfieber auch zu begleiten pflegen, habe ich absichtlich oben bey der Hirnwassersucht nichts erwähnet.

Der periodische Gang der Zufälle, die gemeiniglich zu bestimmter Zeit anfänglich wiederkommen, der sichtbare Nachlaß derselben und ihre Rückkehr, die so deutlichen guten Zwischenzeiten, da der Kranke, wo nicht von allem befreit, doch wenigstens erleichtert ist, völliges Bewußtseyn genießet, müssen hier die Diagnosis erleichtern, und entscheiden über den Unterschied beyder Krankheiten, — noch gewisser das Fieber selbst, das, wenn es bey der ersten Anwandlung auch mit einem andern verwechselt werden kann, doch bey einer scharfen Untersuchung am folgenden Tage schon intermittiret; und wenn auch die Anfälle nachher mehr remittiren als intermittiren, oder gar zusammenlaufen, so ist doch bey dem soporösen Fieber nie der ungewöhnlich langsame Puls da, wie in der Hirnwasser-

sucht,

sucht, selbst nicht einmal in der deutlichsten Intermission oder Apyrexie. Noch weniger ist das Kind im Stande, bey der reinen Hirnwassersucht im Bette aufrecht zu sitzen, oder sich gar außer Bette aufzuhalten, sondern die Krankheit läuft ununterbrochen fort.

Die Intermission bey dem Todtenfieber ist freylich nur nicht immer so deutlich, daß sie dem Kranken erlaubte, während derselben sogar außer Hause zu seyn, wie der Frau, wovon Werlhof erzählt (opera medic. p. 69), daß sie ihm gegen Abend auf der Straße begegnet sey, und ihn gebeten habe, sie am folgenden Tage gelegentlich zu besuchen, weil sie alsdann einen Anfall vom Fieber wieder erwarte, und die er bey seinem Besuche am folgenden Morgen auch im Fieber — aber schon agonisirend, fand. Man hatte in den vorhergehenden Anfällen vom Fieber den tiefen Schlaf so wenig für verdächtig angesehen, daß man ihr denselben als wohlthätig und erquickend nicht hatte rauben wollen, sondern sie ungestöhrt darin liegen lassen.

Oft ist hingegen die Intermission so unmerklich, oft bloß einer Remission ähnlich, daß die

die größte Aufmerksamkeit nöthig ist, den Typus herauszubringen. Diese empfehle ich hier wiederholend anstatt aller weitern Vergleichung beyder Krankheiten, und hoffe die Leser überzeugt zu haben, daß man bey den Erscheinungen, welche als Kennzeichen von Hirnwassersucht betrachtet werden, eben so oft, wo nicht noch öfter, an das Todtenfieber, als an Würmer, zu denken die größte Ursache habe.

§. 99.

Ich kann diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einmal auf die Theorie zurückzukommen, nach welcher man die Hirnwassersucht nicht zu Wassersuchten, sondern zu Schlagflüssen rechnet. Das oben unter A. beschriebene plötzliche Entstehen, der fieberhafte Zustand, das betäubende Kopfweh, bringen sie freylich einer Phrenitis nahe, oder geben ihr den Anstrich einer ähnlichen Entzündung, und man darf sich nicht wundern, daß einige Aerzte der neuesten Zeit alle Zufälle noch bestimmter aus einer entzündlichen Ursache erklärt haben, besonders Withering on the foxglove. 1785. p. 197. Quin,

on

on the dropsy of the brain. Lond. 1790. Rush med. inquir. and observat. 1797. Vol. II. Rand medical papers communicated to the Massachusets-society. Boston 1790. Nr. 1. Ich gestehe jedoch, daß bey allen den Sectionen, welchen ich von solchen Kranken beygewohnt, und wo ich die beschriebenen großen Zufälle bey Lebzeiten der Kranken beobachtet hatte, nicht ein einzigesmal etwas gefunden habe, das auf Entzündung unter dem Hirnschädel hingedeutet hätte, auch nicht die gewöhnlichen Spuren oder Folgen einer Entzündung, nämlich Vereiterung, Brand, Verhärtungen, oder auch die nach Entzündung in der Brust- oder Bauchhöhle gemeiniglich erzeugte eiterähnliche Feuchtigkeit — sondern bloß jene klare Flüssigkeit von mehrern Unzen. Ob diese nun, ohne alle weitere Merkmale, für ein Produkt einer wahren Entzündung dürfe angesehen, und als ein Beweis für diese Theorie angenommen werden, das muß ich Andre entscheiden lassen.

Morgagni, sagt man, hat ja Fälle beschrieben, wo er nach einem Schlagflusse zuweilen

len nichts als Wasser in den Gehirnhöhlen gefunden; aber ist das Beweis, daß nach Entzündung sich Wasser erzeuge? nicht vielmehr, daß es eine seröse Apoplexie gebe? oder von ausgetretenem Wasser Jemand sterben könne? Unter den vielen Sectionen, welche Watson, Fothergill ꝛc. beschrieben haben, finde ich gleichfalls nichts, das einer Entzündung ähnlich gewesen wäre, sondern gemeiniglich Wasser in den Hirnhöhlen zu mehrern Unzen. Inzwischen darf ich nicht leugnen, daß Rush doch Anhäufung vom Blute, und einen entzündungsartigen Zustand einige Male will angetroffen haben, und seine Gründe, die er für die neue Theorie angiebt, sind desto stärker, da er sich, wie er sagt, nicht ein einziges Mal geirret hat, wo er Wasser im Kopfe vorher vermuthet hatte, und man also seiner großen Erfahrung trauen muß. Aber es ist doch auffallend und schwer zu erklären, wie er selbst da noch etwas entzündliches vermuthete, und Blutausleerungen rieth, S. 221, wenn er das Kind in dem Stadio der Krankheit fand, wo der Puls schon so außerordentlich langsam war.

Mit der Erfahrung dürfte diese neue Theorie von Entzündung auch deswegen schwer zu vereinigen seyn, da der fernere Lauf der Krankheit gar nicht damit übereinstimmt, und der Puls, nach Verlauf von einigen Tagen, anstatt immer an Lebhaftigkeit, wie in ähnlichen Fällen, zuzunehmen, ungewöhnlich langsam wird, und vielmehr einen ganz entzündungslosen Zustand verräth. Auch tödtet diese Krankheit niemals so geschwind, innerhalb wenigen Tagen, wie gemeiniglich andre Entzündungs-Krankheiten (ein Kind, welches mir von allen am geschwindesten starb, brachte es doch auf 8, und ein anderes auf 11 Tage, und auch da war der entzündungslose Zustand nicht zu verkennen).

Müßte das Kind nicht sogleich bey der ersten Anwandlung des Uebels, als im phrenitischen Zustande, mehr irre reden als betäubt liegen? Sollte das laute Geschrey nicht sogleich anfänglich bey entstehender Entzündung bemerkt werden müssen, wo sie am schmerzhaftesten ist? Man hört es aber erst nach Verlauf von einigen Tagen, so wie auch die wirkliche Angabe vom

Kopf-

Kopfweh. Hat man etwas Analoges in der Natur? Hat man eine Entzündung, die am 4ten Tage schon still stehet, und wo nun der Puls, anstatt seinen natürlichen Gang bey der Besserung allmählig wieder anzunehmen, oder bey der Verschleimung geschwinder zu werden, sogar außerordentlich langsam wird? Weiß man mehr Exempel, daß eine wässerigte klare Feuchtigkeit als Produkt oder Folge einer offenbaren Entzündung irgendwo entstanden ist? und in so kurzer Zeit? Denn man dürfte sie doch nicht länger annehmen, als bis der Puls, etwa am 4ten oder 5ten Tage, die ungewöhnliche Langsamkeit erhält.

Das einzige Exempel, welches ich unter vielen gesehen habe, wo Blutausleerungen vielleicht nützlich gewesen wären, war bey einem 2 — 3jährigen Kranken, wo die Zufälle jedoch nur eine Aehnlichkeit mit den bey wahrer Hirnwassersucht hatten, einige völlig davon abwichen, und am 9ten Tage der Tod ohne Convulsionen erfolgte; hier war kein Extravasat irgend einer Flüssigkeit, oder sonst etwas im ganzen Körper, wie Ursache zu entdecken, als ein falscher ziemlich

lich fester Polyp im sichelförmigen Sinus; eine Erscheinung, die mir bey solchen Kinderkrankheiten oft vorgekommen ist, und wobey ich mich nicht genug wundern kann, daß die größten Zergliederer, welche um die Pathologie zugleich sich so große Verdienste erworben, als um die Anatomie, Morgagni, Lieutaud, Portal, Baillie, Sömmerring, sie unberührt lassen, vielleicht, weil sie es nicht der Mühe werth hielten, oder einen solchen Polyp als unbedeutend, unschuldig, oder erst nach dem Tode, wie andre falsche Polypen oder Schleimpfröpfe in den großen Blutgefäßen rc., erzeugt ansahen?

Daß Kinder zuweilen wirklich apoplektisch sterben, braucht man ja gar nicht zu leugnen; aber man darf eben so wenig leugnen, daß sich nach den beschriebenen Zufällen eines innern Wasserkopfs oft keine Spur einer wahren Apoplexie, sondern bloß Wasser, entdecken lasse — jene Ursache also wol nicht allgemein seyn, oder in allen Fällen eine Anhäufung vom Blute angenommen werden könne. Das äußerste, was mir von dieser Theorie annehmlich zu seyn scheinet,

net, wäre, daß in der ersten hitzigen Art dieser Krankheit, welche ich unter A. beschrieben, bey Gelegenheit des anfänglichen Fiebers, ein größerer Antrieb, Andrang des Blutes, oder irgend eine ähnliche Congestion nach dem Kopfe entstehe (ohne jedoch eine wahre Entzündung zu heißen), während welcher in den folgenden Tagen mehr in die Gehirnhöhlen ausgedünstet werde und sich ansammle, als die resorbirenden Gefäße wieder in Verhältniß aufzunehmen oder abzuleiten vermögen. Wenn diese Anhäufung von ausgedünsteter serösen Materie wirklich erfolgt ist, dann wird durch den Druck desselben auf das Gehirn, der Puls vielleicht so langsam, als man gemeiniglich findet, und es entstehet so nachher das ganze fürchterliche Heer der übrigen Zufälle.

Auf diese Art lassen sich, wo ich nicht irre, die verschiedenen Meynungen über die Entstehung dieser Krankheit am leichtesten mit einander vereinigen, und auch die einer Entzündung ähnlichen Erscheinungen, welche einige unter den Hirnschädel wollen gefunden haben, am natürlichsten erklären. Man mag es auch meinetwe-

gen, um die Krankheit zu modernisiren, um in der neuen Kunstsprache zu reden, eine asthenische Entzündung nennen, zumal da zuweilen Wein Hülfe geleistet haben soll.

Die glückliche Wirkung, welche Rush und wenige Andre zuweilen von Blutausleerungen gefunden zu haben rühmen, sind allein nur ein schwacher Beweis für die entzündliche Ursache; denn sie werden überhaupt ja in vielen andern Fällen nützlich, wo diese entschieden nicht ist, sondern höchstens jene Congestion nur Statt findet, die ich mit nichts treffender vergleichen kann, als mit der, wo molimina mensium den Frauenspersonen, besonders unverheyratheten, ganz periodisch alle 4 Wochen solche schmerzhafte Beschwerden im Leibe, mit Erbrechen rc. erregen, daß sie oft nicht außer Bette seyn können. Blutigel rc. helfen hier allerdings auch, aber ich kürze die Schmerzen noch gewisser ab, wenn ich, nun schon nach einer 30jährigen Methode, sogleich bey der ersten Anwandlung derselben, oder noch gewisser, gegen die Zeit, wo man sie befürchtet oder erwartet, aloestische Mittel

tel gebe, die in einem wahren entzündlichen Zustande wohl nicht gut anwendbar seyn mögten. Außerdem haben ungleich mehr Beobachter, unter andern Borsieri, keine Wirkung von Blutausleerungen in der hitzigen Art des Wasserkopfs gesehen.

Weit öfter scheint jedoch die entferntere Ursache dieser Krankheit ein Fall auf den Kopf zu seyn. Bey meinen Kranken dieser Art waren Viele, nach genauer Erkundigung, oft mehrere Wochen vorher, so gefallen. Auch hat mir der ehmalige Leibarzt Wagler zu Braunschweig einen solchen Fall genau beschrieben. Man würde wahrscheinlich diese Ursache noch öfter finden, als man glaubt, wenn man immer der Wahrheit auf die Spur kommen könnte, und die Wärterinnen aufrichtig genug wären, den Fall anzugeben, oder die Verwandten es nicht deswegen als unbedeutend verschwiegen, weil es so lange vor der Krankheit geschehen ist. Viele Beobachter, sehe ich, sind über diese Ursache mit mir einstimmig, und sagen ganz genau, daß das Kind vorher auf den Kopf gefallen sey.

Da hier also ein ganz anderer Umstand entfernten Anlaß zu der Krankheit giebt, so ist auch nicht nur die nächste Ursache, sondern auch die Scene selbst bey diesen Kranken davon unterschieden. Es bedarf nur der Zerreißung eines kleinen Gefäßes im Gehirne, das allmählig die Quelle von vielen Unzen Feuchtigkeit wird, die allein durch den Druck alle die beschriebenen Zufälle, besonders Betäubung und Lethargie erregen kann, welches die zuweilen ganz unerwartete und langsam erfolgende Lethalität leichter Kopfwunden ꝛc. unter andern bestätiget.

Aus beyden entfernten Ursachen wird es auch zugleich erklärbar, warum man gemeiniglich die gesundesten und muntersten Kinder von der Hirnwassersucht befallen siehet, und man darf daher nie eine allein annehmen.

Ob übrigens das in den Hirnhöhlen vorgefundene Wasser bloß vermöge seines Drucks immer die nachtheilige Wirkung thue, und die schweren Zufälle hervorbringe, oder nicht auch zuweilen eine schädliche Eigenschaft, eine gewisse

auf-

auflösende Schärfe rc. annehmen könne, das bleibt mir zweifelhaft, da ich einmal bey einem solchen Kinde unter der behutsamsten Section eines geschickten Wundarztes die thalami nervorum opticorum gleichsam in einen Brey aufgelöset und zerstöhrt gesehen habe, und sich daselbst eine flockenartige Substanz mit dem ausgetretenen Wasser vermischte.

Daß auch Erkältung, und plötzlich gestörte Ausdünstung, zu dem Fieber Anlaß geben könne, worauf gewöhnlich die Zufälle der Hirnwassersucht folgen, glaube ich aus 3 mir vorgekommenen Fällen schließen zu dürfen, und ich denke, die Pathogenie ist hier nicht schwer.

Eine völlige Blindheit mit erweiterter Pupille, welche ich einmal in der 3ten Woche nach einem Scharlachfieber bey einem Kinde entstehen sehen, aber bald glücklich gehoben habe, und wovon ich bey O d i e r ähnliche Exempel finde, kläret ohne Zweifel die Entstehung der Hirnwassersucht mit auf, da sie wahrscheinlich auch von ausgetretenem Wasser entstand, was nach dem

Schar:

Scharlachfieber eine so gewöhnliche Erscheinung ist.

§. 100.

In dem vorigen §. habe ich mich so weit von meinem Plane, einer simplen reinen Diagnostik, schon entfernt, und pathologische Untersuchungen mit hineingebracht, daß ich hoffe, die Leser werden mir auch die 2te Uebertretung vergeben, wenn ich nun auch dem Plane noch weiter ungetreu werde, nämlich noch einige practische Reflexionen beybringe.

Die große Wirkung des Quecksilbers bey dieser Krankheit, welche eine Entdeckung der neuern Zeiten ist, habe ich erst spät aus meiner eignen Erfahrung kennen gelernt; vielleicht war ich vorher zu furchtsam, es anzuwenden, oder zu ungewiß über den eigentlichen Sitz des Uebels. Wo ich ein Kind dadurch einmal gerettet sahe, da war ich am 4ten Tage der Krankheit hingerufen, die sich, nach Angabe des bisherigen Arztes, als ein gewöhnliches Fieber ohne besonders

her-

hervorstechende Symptomen gezeigt hatte. Ich fand das 3jährige Kind mit offnen Augen blind, gegen alle ihm vorgehaltene Objecte gleichgültig, wie auch gegen Licht unempfindlich, einen sehr erweiterten Augenstern, ohne Verstand, und bey vielem Schlummer den Puls unordentlich und sehr langsam, dabey grüne Excremente. Es bekam nun alle 2 Stunden einen Gran vom versüßten Quecksilber, jedesmal mit 6 Gran Jalappenwurzel. Zugleich wurden alle Tage 2 Quentchen von der neapolitanischen Salbe auf die Schenkel eingerieben, und ein spanisches Fliegenpflaster im Nacken gelegt. Am 4ten Tage nach dieser Behandlung erfolgte darauf ohne Speichelfluß, aber auch ohne Würmer, der Anfang der Besserung, und allmählige Genesung. Auch ohne Zusatz von Jalappe würde das Quecksilber keinen Speichelfluß erregt haben, da Kinder so selten oder nie, selbst durch unglaublich große Gaben desselben, dazu bewegt werden.

Ein anderes Kind, das nach einem ziemlich lange vorhergehenden Fall auf den Kopf,

bey den gewöhnlichen Zufällen auch die Sprache verloren hatte, und, welches höchst merkwürdig scheint, wenn es auf dem Rücken lag, sich sogleich erbrach, rettete ich durch ein Zugpflaster im Nacken, ohne Quecksilber.

Jedoch welch ein schwacher Trost für mich über die Vielen, welche ich an dieser Krankheit verloren habe!!

M.

M.

1. Urticaria, urticatio; Nesselsucht. Febris urticata; Nesselfieber; engl.: Nettle-rash; franz.: Fievre ortiée.

2. Scabies; Krätze; engl.: Itch; franz.: Galle.

3. Morbilli; Masern; engl.: Measles; franz.: Rougeole.

§. 101.

So lange wir uns über die ersten allgemeinen Grundbegriffe bey exanthematischen Krankheiten nicht verständigen, so lange wir uns über die Terminologie oder Bedeutung von Wörtern nicht vereinigen, womit wir gewisse Erscheinungen auf der Haut im Allgemeinen bezeichnen, und der eine z. E. Papula nennet, was bey dem andern Pustula und bey dem dritten Phlyctaena heißt 2c., haben wir auch keine Hoffnung, die entsetzliche Verwirrung der speciellen Begriffe bey Ausschlagskrankheiten verringert zu sehen. Ein Grund dieser traurigen Verwirrung liegt freylich mit darin, daß unsere Kunstsprache, wenigstens die deutsche, noch

nicht

nicht reich genug ist; es fehlt uns immer noch an Wörtern, gewisse Begriffe auszudrücken, gewisse Erscheinungen ohne Paraphrase zu nennen, gewisse Hautkrankheiten zu versinnlichen. Mit dem Worte Ausschlag verbinden wir, bey der Armuth unserer Sprache, so manchfaltige und oft ganz unterschiedene Begriffe, daß wir uns schon begnügen müssen, wenn wir nur wissen, daß der Ausschlag juckt oder nicht juckt, daß er über der Haut erhaben ist oder mit ihr gleiche Höhe hat ꝛc. Denn man lese nur einmal eine Beschreibung, die ein Beobachter versucht hat, von der Figur desselben zu geben; man wird bey dem dritten Worte schon langsam lesen müssen, um nicht sogleich irre zu werden. Und wenn wir die Kunstwörter aus fremden Sprachen entlehnen wollen, und z. E. Effloreseenz, Exanthem einführen, so kommen wir doch dadurch noch nicht viel weiter. Denn selbst in der lateinischen Sprache sind die Bedeutungen von jenen und vielen andern Wörtern so schwankend und unbestimmt, und werden so oft willkührlich gebraucht, daß man auch dadurch eben so wenig gewinnet, als durch Rash der Engländer, oder durch

Echa-

Echabaulure, Ebullition etc. der Franzosen.

Instructiv würde es ohne Zweifel seyn, wenn Jemand aus seiner großen Lectüre nur eine starke Sammlung von Synonimien machte, und, so wie man bey Cullen, Sauvages und wenigen andern Verfassern von Nosologien findet, daß es bey gewissen caracterisirten Ausschlags-krankheiten mit Nutzen geschehen ist, uns sagte: z. E., was Scarlatina bey diesem oder jenem heißt, das hat Tissot unter den Namen von Esquinancie putride; was Sydenham Masern nennet, beschreibt Cullen unter dem Namen von Rötheln u. s. w.

Lange Zeit hatte ich auch großes Vertrauen zu einer Arbeit, die ein Arzt von Erfahrung, Lectüre und Sprachkenntniß verfertigen müßte (da man doch einmal die Hoffnung beynahe auf-geben muß, durch simple Beschreibungen diese Krankheiten kenntlicher zu machen) — einem noso-logischen Polyglotten-Lexicon; nicht etwa, um die Etymologie von den verschiedenen Wörtern her-auszubringen, oder die Verwandtschaft der Spra-

chen

chen zu entdecken, die Sprachkunde rc. zu bereichern; sondern die Begriffe von vielen Wörtern durch andre Sprachen zu erleichtern oder zu berichtigen. Wenn das Wort in der einen Sprache alsdann nicht verständlich genug wäre, dann würde es vielleicht so in einer daneben gestellten. Ein Werk dieser Art hat nun wirklich ganz neulich ein Nichtarzt geliefert, und gewiß mehr geleistet, als unter hundert Aerzten von Profession vielleicht nicht ein einziger im Stande gewesen wäre zu leisten, den eisernen Fleiß und die Geduld bey der trocknen und gewiß nicht sehr angenehmen Arbeit nicht einmal mitgerechnet. Aber die Ausführung überzeugt mich, bey genauer Ansicht, daß die Absicht, welche ich als Nosologe dabey so eben angegeben habe, nicht erreicht ist, sondern, um das Werk, ob es gleich sonst für manchen Arzt von großem Nutzen seyn mag, der Vollkommenheit näher zu bringen, es nicht bloß durch die Hände eines so großen Sprachforschers, als der Verfasser ist*), gehen müßte,

son=

*) Nemnich Lexicon nosolog. polyglott. Hamb. 1801. fol.

sondern eines Sachkundigen, der hin und wieder etwas darin zu berichtigen finden, und z. E. nicht Phoenigmus durch rothe Nesselsucht, Phymata nicht durch Eiterblasen verdeutschen, oder Scelotyrbe durch Scorbutus, Trismus nicht durch Tic, Rubeolae nicht durch red Measles übersetzen würde; denn der beobachtende Arzt kennt so wenig rothe Nesselsucht als rothe Masern, die von andern Masern sich unterschieden, und einen Pleonasmus also unnöthig machen. Es werden auch die Grundbegriffe dadurch nicht erläutert, sondern vielmehr verworrener, wenn Phlyctaenae Hitzblattern, Papulae Stippen, Knötchen genannt werden, als welches ich zu meiner Absicht vorzüglich bey einer solchen Arbeit ehedem wünschte.

Da nun der erfahrne Arzt, wenn er auch noch so reich an Worten ist, durch Beschreibungen allein sich außerdem nie gegen einen jüngern verständlich genug machen, oder ihn eine solche Krankheit kennen lehren wird, das selbst einem Maler oder Kupferstecher so selten glücket, so bleibt für ihn nichts als Autopsie übrig; er

muß

muß ihn mit an das Krankenbette führen, ihm die Krankheit in Natura zeigen und sagen: dies ist Herpes, dies ist Lichen, hier Zona. (Der einzige Vortheil, den junge Aerzte von ihren Reisen und Besuchen großer Hospitäler erwarten dürfen, nicht sowohl ihre Therapie als ihre Nosologie zu bereichern.) Vielleicht kennete ich aus allen ehemaligen akademischen Vorlesungen, aus aller Lectüre, noch diese Stunde den Gürtel nicht, wenn ihn mir Werlhof nicht am Krankenbette selbst gezeigt hätte.

Bey diesen großen Schwierigkeiten traue ich mir gewiß eben so wenig zu, durch Beschreibungen von Krankheiten andre zu übertreffen, oder größern Nutzen zu stiften, und daher bin ich, weil ich dieses lange erkannte, auf die Idee einer Diagnostik gekommen, da diese mir als das einzige Mittel übrig zu bleiben schien, deutlich zu werden, und die Vergleichung einer Krankheit mit der andern das Gemälde am besten heben muß.

Man findet leider, daß auchselbst einem geübten Auge der Unterschied noch sogar von solchen

Krank-

Krankheiten zuweilen entgeht, die man doch bey unzähligen Menschen sehr oft in ganzen Epidemien zu sehen und zu beobachten Gelegenheit hatte, die sogar etwas hervorstechendes hatte, das sogleich in die Augen fällt, wo nur die Oberfläche des Körpers allein braucht untersucht zu werden, um ihren Caracter zu entdecken, wo man nicht, wie in vielen andern seltner vorkommenden Fällen, sich nur mit Wahrscheinlichkeit begnügen muß, oder bloß Analogie, Affinität übrig bleibt. Ich habe in diesem Buche schon viele überzeugende Beweise von dieser traurigen, und für den menschlichen Verstand überhaupt sehr demüthigenden Wahrheit beygebracht; es ist mir leid, daß ich die Exempel noch immer mit neuen vermehren kann, und die große Verwirrung zeigen muß, welche selbst bey den sichtbarsten und häufigsten Krankheiten herrschet.

Wenn ich es nicht selbst am Krankenbette mehrmalen erlebt hätte, oder es geschrieben stünde, so daß ich es aus Schriftstellern beweisen kann, so würde es mir unglaublich scheinen, daß man auch die auf dem Titel genannten Krankheiten

verkennen oder mit andern verwechseln könne. Nun aber finde ich, daß Sydenham das Nesselfieber für eine Art Rose hält, Sauvages für eine Art Scharlachfieber, Ost; Schacht es sogar für rothes Friesel, und als eine gefährliche Krankheit ansiehet. Heberden, der genaue Beobachter, der den Ausschlag übrigens sehr nach der Natur beschreibt *), hat es schlechtweg immer Essera genannt, ohne Gründe für diese Benennung anzugeben, so auch andre Engländer, z. E. Chalmers **).

Winterbottom nennt sogar den Ausschlag, welchen er von Rhus entstehen sehen, irrig: Nettle-rash, urticaria ***); seine Meinung wird aber leicht Jemand widerlegen können, der die Beschreibung dieses Ausschlages allenfalls nur in meinen kleinen medicinischen Schriften 1799 S. 236 nachsiehet.

Je=

*) Medical Transactions, II. Art. XI.

**) On the weather et diseases of South-Carolina. 1776. p. 87.

***) Medical facts et observations. Vol. V.

Jedoch, die Classification oder Benennung dieses Ausschlages würde bey dem sehr gleichgültig seyn, von dem man siehet, daß er, wie etwa Heberden, ihn sehr genau kennt; wenn nur grade diese Benennung nicht wieder einem andern einen irrigen Begriff davon beybrächte, der ihn nun da gewiß nicht zu sehen glaubt, wo er ihn wirklich siehet.

Hoffentlich wird man es also nicht für ganz überflüssig halten, wenn ich hier diesen Ausschlag mit 2 andern zusammenstelle, womit er wegen größerer Aehnlichkeit noch leichter verwechselt werden kann, als mit denen, womit die obengenannten Schriftsteller ihn verglichen haben. Ich darf jedoch hier die Widerlegung oder den Beweis nicht übernehmen, wie weit sich jene Beobachter bey ihrer Benennung von der Wahrheit entfernt haben, wenn sie diesen Ausschlag bald unter Friesel bald unter Rose rc. setzten. Ich halte mich dagegen bey dem Nesselfieber auch deswegen länger auf, weil man von diesem weniger vollständige Beschreibungen hat, als von Masern oder Krätze, wenigstens keine

Monographie; doch lasse ich das höchst interessante Programm des Prof. Koch, Leipz. 1792, dafür gelten.

§. 102.

Auch diese Krankheit, welche in vielen Sprachen eben denselben caracteristischen Namen erhalten hat, wie ich ihn auf dem Titel angegeben, müßte desto weniger, sollte man glauben, mit andern von Jemanden verwechselt werden können, der nur jemals von Nesseln berührt oder von Mücken gestochen worden ist. Sie ist oft chronischer, oft hitziger Art, und mit Fieber verbunden. Was hier febris urticata, dort urticaria heißt, verhält sich grade so gegen einander, wie febris bullosa und Pemphigus, oder wie Petechien und die Blutfleckenkrankheit; denn der Ausschlag im Nesselfieber und Nesselsucht ist völlig derselbe. Keine Constitution, kein Alter ist davor in irgend einer Jahrszeit sicher. Sie ist nicht ansteckend, auch nie epidemisch, und überhaupt die leichteste, gefahrloseste, exanthematische Krankheit, die wir bisher noch kennen. Selbst, wenn sie sich mit

an-

andern complicirt, wie ich es bey hitzigen und chronischen Krankheiten gesehen, verschlimmert sie diese nicht, und wenn sie für sich eigends und ursprünglich bestehet, selbst in dem höchsten Grade, wo z. E. das ganze Gesicht geschwollen war, auch bey der längsten Dauer, habe ich sie nie von schlimmen Folgen oder gar tödtlich gefunden. (Ihre Erscheinung beym Bluthusten schien mir jedoch ominös zu seyn, und auch die Angst der Schwermüthigen damit zu sympathisiren.) Aber bey aller dieser Unwichtigkeit ist doch die Angst, welche sie oft außerdem begleitet, und das sehr beschwerliche Brennen und Jucken, die Langwierigkeit nicht einmal mit in Anschlag gebracht, nicht weniger einer Aufmerksamkeit werth, als Krätze oder ein andres Uebel, daran auch Niemand stirbt; sie bleibt immer Krankheit, und der Arzt muß sich ja oft mit weit geringern Uebeln beschäftigen, die noch weit weniger Beschwerde, als hier das unausstehliche Jucken allein, mit sich führen. Auch muß sie, wenn auch der praktische Arzt sie unbedeutend findet, den forschenden Pathologen wegen einiger Sonderbarkeiten oder Eigenheiten, wodurch sie sich

vor allen auszeichnet, interessiren, und ihm merkwürdig werden. Aber noch gewisser ist sie einer nähern Bekanntschaft werth, weil man sie mit einer größern und wichtigern Krankheit verwechseln, diese also für eben so unwichtig ansehen, und darüber vernachlässigen kann.

Ich will es jetzt versuchen, diesen Ausschlag mit seiner Krankheit kenntlich zu machen; denn er erscheint auch nicht immer in der bestimmten Figur einer isolirten Papula (Quaddel), wie von Nesseln oder Mücken erregt; und grade diese Abweichung, dieser höhere oder niedrige Grad desselben muß manchen verleitet haben, daß er ihn für etwas andres hielt, als er wirklich ist. Eben so siehet man ja aber auch, daß bey einer gewissen Constitution der Haut zuweilen bey dem einen Menschen ein Mückenstich eine weit ausgebreitete Art von Entzündung mit einer Spur von Eiterknöpfchen erregt, der bey einem andern nur ein Phyma von geringem Umfange und kurzer Dauer hervorbringet.

Das Nesselfieber ist von der Nesselsucht bloß durch die Dauer und das Fieber unter-

unterschieden, indem der Ausschlag selbst grade derselbe in dem einen Falle ist, wie in dem andern. Das Fieber hat außer der leichten Anwandlung, welche dem Kranken erlaubt, dabey fast immer außer Bette zu bleiben, nichts hervorstechendes von Symptomen, außer einem unerträglichen Jucken, und einer oft wiederkommenden Angst, zuweilen auch wohl gelindes Leibweh. Anstatt daß bey dem chronischen Uebel dieser Art der Ausschlag zuweilen von der Haut verschwindet, nach einer ungewissen Zeit wieder auf einzelnen Theilen des Körpers erscheinet, und so abwechselnd Monate lang fortdauert, ist bey dem Nesselfieber derselbe beständig auf der Haut gegenwärtig, und auf mehrere Tage eingeschränkt, nach deren Verlauf er denn aber gänzlich unsichtbar wird, und nicht wieder zum Vorschein kommt. Gemeiniglich ist bey dem Nesselfieber der Ausschlag stärker als bey der Nesselsucht, über einer größern Fläche des Körpers verbreitet, in einem hohen Grade desselben das ganze Gesicht durch die zusammenlaufenden Quaddeln verstellt, und, wie die Hände und Füße, dabey geschwollen, so daß der Kranke die Hände fast nicht zu-

sammendrücken, oder etwas damit festhalten kann. Es entsteht zuweilen, obgleich höchst selten, alsdann sogar ein wirklicher Speichelfluß dabey, der außer dem juckenden und brennenden Ausschlage sehr beschwerlich wird. Die äußerste Grenze des Fiebers sind 9 Tage, gewöhnlich weniger, und es weichet so gelinden Mitteln, daß ich mich nicht länger dabey aufhalten darf, sondern zu dem Ausschlage übergehen kann, wie man ihn in dem chronischen Falle findet.

Bey Einigen dauert hier der Ausschlag ohne alles Fieber nur wenige Tage, bey Andern eine unbestimmte Zeit von Wochen, Monaten, sogar Jahren; das heißt: er verschwindet in dieser langen Zeit oft mehrere Tage rc., kommt dann wieder heraus, und verschwindet wieder; aber der Grund und die Anlage dauren auf diese Art beständig fort. Bey einigen Subjecten ist in der ganzen Zeit immer etwas davon auf der Haut sichtbar. Ein Kind hat mich selbst über 2 ganze Jahre damit ermüdet, und ein anderes beynahe 4 Jahre meine Geduld erschöpft. Heberden hat ihn eben so 2 Jahre lang, mit

sehr

sehr kurzen Zwischenzeiten, bey verschiedenen Menschen gesehen, bey einigen 7 bis 10 Jahre*).

Die in so vielen Sprachen gebräuchliche Benennung dieses Ausschlages ist freylich allein schon caracteristisch, so wie die vom Pemphigus, und wenn man ihn verkennt, so dient das einigermaßen zur Entschuldigung, daß er nicht immer dieselbe Figur behält, wie da, wo die Haut von Nesseln oder Mücken gelitten hat. Denn auch das ist Nesselsucht, was von Nesselstichen oder Mückenstichen sehr abweichet, wenn 1) rothe lange harte Streifen, als von Peitschenhieben erregt, auf der Haut erscheinen; 2) wenn z. E. die Oberfläche des ganzen Rückens braunroth aussiehet, und das peinliche Jucken fast allein den Unterschied vom Scharlachfieber macht; 3) wenn die Quaddeln im Gesichte so zusammenstoßen, daß sie nichts weniger als einzelnen isolirten discreten Mückenstichen ähneln, und das ganze Gesicht anschwillt. Noch eine Erscheinung, wo der Ausschlag der Krätze sehr nahe kommt, wird mir unten Gelegenheit geben, ausführlicher davon zu reden.

Der

*) Medic. transact. II. 175.

Der Nesselausschlag überhaupt, hitziger oder chronischer Art, ist merklich fühlbar und sichtbar über der Haut erhaben, hart, fest, mehr von todtenblasser, als rother, im Mittelpunkte fast weißer Farbe, ohne eine Flüssigkeit zu enthalten, oder in eine Spitze sich zu erheben, eine Borke oder dergleichen zu formiren; geht auch niemals in Eiterung über. Nicht ganz genau ist dieses bey einem Mückenstiche, wo man wirklich zuweilen die Quaddel nicht so glatt und eben, sondern eine kleine Erhöhung findet. Richtiger bleibt daher immer der Vergleich mit dem von Nesseln entstehenden Ausschlage. Der gewöhnliche Umkreis, wenn die papulae allein stehen, ist selten größer als der Nagel eines Fingers, öfters kleiner; wenn sie aber sich berühren, heben sie die ganze Haut zuweilen im Umfange von einer ganzen Hand, und erregen an den leidenden Theilen eine solche Geschwulst, daß man sie nicht mehr für papulae (was die Engländer wheals nennen) erkennt, und also die ganze Figur sowohl hier, als überhaupt, sehr unregelmäßig und unbeschreibbar wird. Vielleicht verstehen mich die Leser, welche dergleichen nie gesehen

sehen haben, besser, wenn ich es ihnen in einer andern Sprache sage. Les tubercules forment, sagt Lieutaud (in s. Précis de la méd. pr.) de larges plaques relevées avec ardeur et démangeaison.

Erscheinen die Phymata insularisch, so haben sie gemeiniglich einen sehr rothen Umfang, verschwinden aber in kurzer Zeit, und kommen, ohne besondre Veranlassung, zu einer andern Zeit wieder heraus. Sie haben keine besondere angewiesene Stelle, sondern die ganze Oberfläche des Körpers ist ihr Theater.

Den höchsten Grad dieses Uebels siehet man da, wo Jemand zuweilen nach dem Genusse von Muscheln (Mytilus edulis) damit befallen wird; denn über die Identität des Ausschlages, welcher alsdenn erscheinet, mit dem ohne alle bekannte Veranlassung entstehenden, und eben beschriebenen darf kein Zweifel übrig bleiben. Die Krankheit, durch diese Ursache offenbar hervorgebracht, und von Berens, Werlhof, Möhring 2c. genau beschrieben, ist jedoch auch hier, wie in den obigen Fällen, mehr

schrecklich als gefährlich, und gemeiniglich weit geschwinder als in einem eigentlichen Nesselfieber, oft schon innerhalb 12 Stunden, wieder gehoben (so daß es mir unerklärbar wird, wie Koch S. 13 die chronische Krankheit daher entstehen lassen könne). Außer einer großen Angst leiden diese Menschen vorzüglich bloß von dem unaussprechlichen Jucken, und der Ausschlag läuft, besonders im Gesichte, bisweilen so zusammen, daß die Augen fast zuschwellen, und überhaupt durch Geschwulst das ganze Gesicht verunstaltet wird.

Seitdem diese Muscheln, welche wir ehedem hier als Leckerbissen über Kiel aus der Ostsee in Hannover erhielten, nicht mehr so häufig hierher kommen, ist dem Arzte auch die Gelegenheit entgangen, Beobachtungen darüber zu machen, und den, bey dem Genusse von Muscheln selbst schon seltnen Fall zu sehen, und ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wann ich einen solchen Fall gehabt habe. Einen völlig so hohen, und wegen seiner Dauer noch stärkern Grad, habe ich 1793 bey einem Manne, ohne allen Genuß von jenen Muscheln, oder ohne andre bekannte Ur-

sache,

sache, gefunden, wo sich erst am 9ten Tage alles endigte, und das heftige Brennen und Jucken mit Fieber und einem 3tägigen Speichelflusse verbunden war, den, wie ich sehe, auch Prof. Koch bemerkt hat, und vom Ausschlage herleitet, der die Höhle des Mundes einnimt, und so die Speicheldrüsen reizt, S. 9.

Man ist übrigens der Ursache dieser Vergiftung durch Muscheln in den neuern Zeiten in den Niederlanden, wo diese Muschel, besonders an den Ufern der Schelde, häufig gegessen wird, näher auf die Spur gekommen, und hat das bestätiget, was schon Werlhof ꝛc. vermuthete, daß die Muschel nicht selbst das Gift enthalte. S. Mémoires de l'acad. des sciences et belles lettres de Bruxelles. 1771. Tom. I. p. 229. et Tom. II.

Einen leichtern Grad, aber unausbleiblich, erfährt einer meiner Bekannten allhier, jedesmal nach dem Genusse von gewöhnlichen Flußkrebsen (Astacus), zuweilen mit Fieber und Kopfweh; eine Erfahrung, die aber schon lange bekannt, und zuletzt von Gruner,

Tode

Tode rc., so wie von Sauvages, vom Genusse einer Fischleber, und von andern wieder vom Genusse anderer Dinge, gemacht worden ist.

Ob nun Muscheln und Krebse rc. die Aetiologie dieser Krankheit aufklären, mögen die Pathologen untersuchen! Es gehört nicht zur Diagnostik. Das zuweilen bey der Nesselsucht auch bemerkte Leibweh zeigt wenigstens, außer dem Genusse der Muscheln, dem praktischen Arzte, daß sie keine locale Hautkrankheit sey, oder er von diaphoretischen Mitteln, Bädern rc. nicht leicht Nutzen erwarten dürfe.

Zu dem Sonderbaren und Merkwürdigen dieser Krankheit, welches ich oben berührt habe, gehört ohne Zweifel, daß sie nicht nur unter Impetigines und Exanthemata zugleich gesetzt werden kann, wie aus dem von mir angeführten hoffentlich erhellen muß, sondern daß da, wo bey dem chronischen Uebel die große Susceptibilität für diesen Ausschlag einmal vorwaltet, die Neigung dazu zuweilen so stark in der Haut liegt, daß man ihn auch wirklich nach Gefallen hervorbringen kann, und, wenn man

nur

nur mit einem Finger drückend an dem Arme herunter fähret, der Weg des Fingers durch eine harte Röthe bezeichnet wird, die eine Zeit lang sichtbar bleibt. Nicht weniger scheint es mir merkwürdig, daß der Ausschlag im Bette gewöhnlich verschwindet, und wieder hervorkommt, wenn der Kranke sich der kalten Luft aussetzet; ein Phänomen, das man gewiß bey andern Ausschlagskrankheiten nicht wahrnimt, und mit zu dem Caracter von dieser zu gehören scheint.

Was ich noch als eine Seltenheit hier beyfügen will, ist, daß ich 1769 ein 2jähriges Kind gesehen, bey dem dieser Ausschlag, fast Sugillationen gleich, bläulich wurde, und wirklich hin und wieder ins schwärzliche fiel, in einigen Tagen aber bey ganz gelinden Mitteln ohne Fieber wieder verschwand. So habe ich auch bey einem verwachsenen Frauenzimmer diesen Ausschlag in einem hohen Grade mit einem trivialen Tertian-Fieber complicirt gesehen, wo er allezeit mit dem Anfalle desselben an dem bestimmten Tage periodisch hervorkam und wieder vergieng, zuletzt aber, eben so wie das Fieber selbst, ohne alle

Kün-

Künsteley, allein durch China weggeschafft wurde. Bey einem 5jährigen Kinde fand ich diesen Ausschlag am 3ten Tage nach dem Ausbruche gutartiger Blattern, wo er in kurzer Zeit sich aber wieder verlor, ohne daß dadurch die Hauptkrankheit in ihrem Laufe wäre gestöhrt worden, oder sich außerordentliche Zufälle gezeigt hätten.

§. 103.

Hätte der chronische Ausschlag, die Nesselsucht, immer dieselbe caracteristische Form und Figur mit dem bestimmten Umfange, als ich sie oben beschrieben habe, so müßte es beynahe abgeschmackt, wenigstens sehr unnütz scheinen, ihn mit Krätze vergleichen, oder diese hier daneben stellen zu wollen, da der unwissendste Barbierer alsdann sie beyde sogleich unterscheiden muß. Die Leser werden auch hoffentlich keine so umständliche Beschreibung von Krätze hier erwarten, als ich sie so eben von dem Nesselausschlage geliefert habe, und ich setze sie wegen der fast beständig unveränderten sphärischen insularischen Figur ihrer Pusteln rc. als bekannt voraus. Was mich aber bewegt, sie dennoch hier aufzustellen,

und worauf ich die Leser nicht aufmerksam genug machen kann, ist, daß beyde sehr oft die größte Aehnlichkeit mit einander haben, und das geübteste Auge alsdann noch täuschen. Bey lange daurendem und oft wiederkommenden Nesselausschlage können nämlich die Kranken, besonders Kinder, sich des Kratzens so wenig erwehren, daß sie die Quaddeln ganz durchkratzen, und kleine Wunden machen; alle diese abgekratzten, ein wenig blutenden Quaddeln formiren alsdann, obgleich sich dieser ursprüngliche Ausschlag zuweilen darunter verlieret, gleichsam kleine Knötchens, entweder mit eiterähnlicher Feuchtigkeit, oder es entsteht ein kleines Knöpfchen in der Mitte desselben, das einer trocknen, nicht ganz frischen Krätzpustel, zumal wenn sie eine große Fläche der Haut einnehmen, höchst ähnlich siehet, und desto mehr irre führt, da zugleich auch das Jucken von Zeit zu Zeit noch fortdauert, wie bey der Krätze selbst, und diese kleine Knöpfchen nicht, wie der Nesselausschlag, sogleich wieder verschwinden. In dem ersten Falle dieser Art, bey einem kleinen Kinde, bin ich selbst ein halbes Jahr irre und ungewiß gewesen, und habe meinen Irrthum

nicht eher eingesehen, als bis ich einmal zufällig Gelegenheit hatte, die Entstehung, das erste Hervorkommen des Ausschlages, zu beobachten, und sichtbare breite Papulas zu entdecken, die nachher auch bald auf die angegebene Art ihre Figur veränderten. Die Ueberzeugung, daß das Kind in der langen Zeit Niemand angesteckt, auch Niemand im ganzen Hause vorher einen verdächtigen Ausschlag, oder nur einen ähnlichen gehabt hatte, belehrte mich über die Natur dieser Ausschlagskrankheit noch gewisser.

Ich finde, daß dem trefflichen Beobachter Heberden (a. a. O.) diese Erscheinung auch nicht entgangen ist; aber gewiß übersehen unzählige andere, die nicht lange genug, und nicht zu verschiedenen Zeiten einen solchen Kranken sehen, den Unterschied zwischen wahrer Krätze und diesem Ausschlage, und mögen ihn auch wohl durch äußerliche Mittel wegzubringen suchen; wodurch sich denn das Unheil erklärt, das man nach zurückgetriebener Krätze so oft beschrieben lieset. Ich will daher sogleich näher bestimmen, worin der Unterschied und die Aehnlichkeit liege.

Da

Da ich aber nicht gern hier erst von der Krätze so ausführlich handeln, und viel von dem wieder abschreiben möchte, was ich darüber schon vor vielen Jahren in einem eignen Buche dem Publico vorgelegt habe, so muß ich neugierige Leser auf jenes Buch verweisen, und werde das Diagnostische allein mit desto größerer Präcision hier anzugeben suchen.

a) Die erste Entstehung von beyden Ausschlägen entscheidet den Unterschied sogleich, und wer dieser nahe ist, oder den Zeitpunkt trifft, sie da zu beobachten, der wird sich nicht leicht irren können; denn die Krätze hat, so bald sie schon wirklich sichtbar wird, ganz bestimmte harte, über der Haut erhabene fühlbare Knötchens, die immer größer werden, immer von derselben sphärischen, oder vielmehr hemisphärischen Figur, und in Pusteln oder Eiterbläschen langsam übergehen; Nesselsucht nicht.

b) Der Krätzausschlag ist also pustulös, d. i., er enthält, eine gewisse Zeit nach seiner Entstehung und sichtbaren Bildung auf der Haut, allezeit eine Feuchtigkeit; Nesselsucht formiret

Phymata, d. i. harte, feste, mehr platte Erhöhungen, die nie eine Flüssigkeit enthalten, niemals runder, sondern unregelmäßiger Figur, sich auch durch ihren größern Umfang schon von Krätzpusteln, so wie im Entstehen also auch im Fortgange, unterscheiden.

c) Die Urtication ist sogleich die ersten Stunden in ihrer Vollkommenheit schon zu erkennen; eine Krätzpustul viel später, oft erst, nachdem sich mehrere derselben auf der Haut verbreitet, nach Tagen, nach Wochen.

d) Die Krätze bildet bey längerer Dauer kleine Borken oder Crusten, die von inspissirter Flüssigkeit oder Eiter entstehen; Nesselsucht niemals, und wenn man wirklich auf ihren papulis zuweilen kleine Knöpfchen oder etwas ähnliches findet, so sind diese bey genauerer Untersuchung, auf die oben angegebene Art, vom Kratzen entstanden.

e) Krätze steckt geschwind an; die Nesselsucht, selbst bey der längsten Dauer, nicht.

f) Krätze, für sich allein, ist immer eine chronische Krankheit, erregt niemals, wie zuweilen der Nesselausschlag, Fieber, oder ist nie ein Symptom eines Fiebers.

g) Krätze verschont das Gesicht; Nesselsucht keinen Theil der Haut, am wenigsten das Gesicht.

h) Krätze juckt am stärksten in der Bettwärme, in freyer Luft weniger, bey großer Kälte gar nicht (jenes ist aus der Reviviscenz oder Belebung, und dieses aus der Erstarrung der Krätzmilben am leichtesten zu erklären); Nesselsucht juckt gewöhnlich am stärksten, wenn der Kranke an die freye Luft kommt, und zuweilen noch stärker in kalter Luft; in der Bettwärme verliert sich oft der Ausschlag ganz; wenigstens juckt er da seltner.

i) Bey Nesselsucht helfen keine äußere Mittel, kein Quecksilber, kein Schwefel, die beide in der Krätze, als einer bloßen Hautkrankheit, sehr bald ihre specifische Wirkung zeigen, und wer diesen glücklichen Erfolg bey einer angeblichen Krätze nicht bald findet, der hat sich

ge-

gewiß geirret, und kann immer entweder eine Complication einer andern Krankheit mit derselben vermuthen, oder auch zuweilen die Nesselsucht, die keine bloße Hautkrankheit ist.

Beyde Krankheiten nähern sich also bloß darin einander, daß ihr Ausschlag über der Haut fühlbar und sichtbar erhaben ist, und stark juckt, und wenn sie gleich beyde sehr langwierig und langweilig sind, doch kein Fieber erregen; denn das eigentliche Nesselfieber entstehet nie in der Folge des langwierigen Ausschlages, sondern wo man es findet, da ist es sogleich bey der ersten Erscheinung des Ausschlages schon da.

Der Unterschied von beyden ist also so groß und deutlich, daß sie nicht anders als wegen des oben angegebenen Umstandes, und der einzigen beschriebenen Aehnlichkeit, verdienten verglichen zu werden. Gewiß giebt es Exantheme, die mit Krätze eine größere Aehnlichkeit haben, als Urticatio; aber diese lasse ich hier jetzt unberührt.

§. 104.

§. 104.

Ungleich schwerer sind **Masern** von dem Nesselausschlage zu unterscheiden, wenn er, mit Fieber verbunden, nicht die Nesselsucht ausmacht, wo er eine Zeit lang verschwindet und wiederkommt, sondern in einer hitzigen Krankheit besteht, darin er beständig einige Tage hinter einander auf der Haut sichtbar bleibt. Am leichtesten wird er alsdann verkannt, wenn bey einem vorkommenden Falle von Nesselfieber an eben demselben Orte zugleich Masern herrschen. Ich habe einen solchen zweydeutigen Fall selbst gehabt, wo ein Kind, nachdem in demselben Hause 3 Masernkranke kurz zuvor genesen waren, auf diese Art befallen wurde, und bloß die Abwesenheit des Hustens und der andern katarrhalischen Beschwerden, nebst dem fühlbaren Unterschiede des Ausschlages, mich mehr für Nesselfieber als für Masern stimmten.

Vielleicht sehen es viele meiner Leser nicht ungern, wenn ich ihnen hier eben so wenig, als von der Krätze, die ganze Geschichte der Masern mit ihren verschiedenen Symptomen rc. beschreibe,

son-

sondern mich sogleich zum Diagnostischen dieser beyden Hautausschläge wende; denn das, was ich ihnen etwa auch als Resultat meiner eignen Beobachtungen aus vielen großen Epidemien über diese Krankheit mittheilen könnte, finde ich selbst nicht so interessant, oder von dem schon allgemein bekannten so abweichend, daß ich glauben könnte, es aus meinen Papieren ausheben und den Lesern hier aufdringen zu dürfen. Es sind größtentheils Bestätigungen einiger von andern Beobachtern vorgetragenen Wahrheiten, und überhaupt zur allgemeinen Kenntniß dieser Krankheit, nach meiner eignen Ueberzeugung, nicht lehrreich genug. Angenehmer würde es mir selbst gewesen seyn, wenn ich, zumal da es mehr in meinen Plan und hierher gehört, hier die Diagnostik hätte mit einer vollständigen Beschreibung und Vergleichung einer Krankheit bereichern können, die man Rötheln an einigen Orten Deutschlands nennt, und die gewiß näher an Masern zu grenzen, und mit ihnen Aehnlichkeit zu haben scheinet, als der von mir neben Masern aufgestellte Nesselausschlag. Aber ich gestehe, daß ich bisher selbst noch einen sehr unvollkomme-

nen Begriff von diesen sogenannten Rötheln oder Ritteln habe, die man hier nicht einmal nennen höret, und davon auch selbst an den Orten die Begriffe noch sehr verworren schienen, wo man ganze Epidemien davon zu beobachten Gelegenheit hat, so daß man bald eine Aehnlichkeit derselben mit Masern, bald mit Scharlachfieber rc. findet.

Da ich ohnehin nicht gern von meinem Grundsatze abweiche, den ich mir einmal bey meiner Schrift festgesetzt habe, keine Darstellung oder Beschreibung von irgend einer andern Krankheit zu machen, als die ich aus eigener Erfahrung kenne, so bin ich, so nothwendig hier auch die Diagnostik diese Arbeit fordern mögte, entschuldiget, und mache mir dagegen desto größere Hoffnung, daß uns einmal ein erfahrner Arzt von Berlin oder andern Orten, wo diese Krankheit vorzüglich herrschend ist, außer dem von Formey in seinen Ephemeriden gelieferten Beytrage, eine ausführliche Geschichte derselben schenken, und uns näher darüber wenigstens belehren werde, ob wir uns irren, wenn

wir

wir unsers Orts sie für Modification von Masern ansehen (darin uns das bestärket, was Kapp in seiner lehrreichen Ausgabe von Cullens Anfangsgründen. 1800. B. 2. S. 106 sagt, daß man das, was man in Sachsen Röthein heißt, mit dem Namen von falschen Masern belegen könne), oder ob man sie näher an Essera und Scharlachfieber rücken müsse. Eine Krankheit, die, der Beschreibung nach, ganze Epidemien ausmacht, und woran so viele sterben, verdiente wohl, daß uns andre Aerzte bekannter damit machten.

Masern und Nesselfieber kommen darin mit einander überein, daß sie

a) beyde einen erhabenen Ausschlag von unregelmäßiger Figur machen, der alle Theile des Körpers, besonders das Gesicht, einnimt, und

b) fast auf eben dieselbe Länge von Zeit eingeschränkt ist.

c) Der Masernausschlag bestehet gleichfalls in festen tuberculis, Flecken, über der Haut erhaben, die keine Feuchtigkeit enthalten, auch

keine

keine Cruste auf ihrer Spitze haben; und wenn gleich Wedekind, der diesen Ausschlag am schärfsten und genauesten von allen untersucht hat *), in manchen derselben, doch in den wenigsten, eine gelblichte klare Feuchtigkeit entdeckt hat, so kann man den Ausschlag doch nicht pustulös nennen, da jene angebliche Feuchtigkeit auf eine unmerkliche Art verschwindet, und die Feuchtigkeit sich nicht, wie bey Krätze, Blattern ꝛc., vermehrt, in Eiter und Borken übergeht, also keine ächte Pustulation in der Folge entstehet. Wahrscheinlich entstehet hier eben so jene Feuchtigkeit, wie bey der Nesselsucht oben beschrieben worden, wenn einige wenige der Flecken jucken und durchgekratzt werden.

d) Der Ausschlag ist bey beyden fast von gleicher Höhe über der Haut, und wird auch bey beyden allmählig breiter. Ich kenne kein Exanthem, das Flecken von der Breite und dem Umfange hätte, als zuweilen die Masern und

*) Röschlaub Magazin. B. IV. St. 2.

und Urtication. Gewöhnlich sind die Flecken discret, isolirt; oft aber berühren sie sich, und werden maculae corymbosae; der Engländer sagt: clustured spots.

e) Beyde Krankheiten siehet man in jeder Jahrszeit, und es ist, nach den vielen großen Epidemien, die ich erlebt habe, erwiesen falsch, daß die Masern z. E. immer auf den Herbst oder Winter eingeschränkt sind. Eben so irrig ist es auch, nach meiner Erfahrung, daß der Nesselausschlag in gewissen Monaten erscheine.

Ihr merklicher Unterschied bestehet aber in folgendem:

a) Masern sind sehr ansteckend, obgleich freylich auch davon, wie von Blattern, einige Menschen zuweilen zeitlebens, andre wieder in der einen Epidemie verschont bleiben, und in der andern davon befallen werden. Gemeiniglich zeigt sich schon am 8ten Tage, oder innerhalb 14 Tagen, nachdem ein Gesunder sich einem Kranken genähert hat, die erste Spur der Ansteckung. Nesselfieber steckt nicht

an.

an. Es kann jedoch dieses Kennzeichen im Anfange der Krankheit, und in einem einzelnen Falle, nicht wohl von Nutzen seyn, sondern nur, wenn man lange darüber in Verlegenheit gewesen ist.

b) Die Symptomen sind sogleich bey der Entstehung, im Anfange der Krankheit, sehr abweichend. In Masern debutirt der Kranke gewöhnlich mit catarrhalischen Beschwerden, Triefen der Augen, der Nase, Husten, der immer stärker wird, und gewiß nur in sehr seltnen Ausnahmen fehlet, Beklemmung oder ähnlichen Beschwerden der Brust &c., Nasenbluten, trüben Augen, die gegen Licht sehr empfindlich sind. Bey Nesselfieber ist von allen diesen, besonders dem fast unzertrennlichen Gefährten der Masern, dem Husten, und Nasenbluten nichts zu bemerken. Das Augenlied ist hier freylich oft geschwollen, aber das Auge selbst leidet niemals, und zeigt auch keine Röthe.

c) Bey Masern entwickelt sich der nach der Oberfläche des Körpers drängende Stoff oft so langsam, daß schon alle jene catarrhalischen

schen Zufälle mehrere Tage zugegen gewesen sind (ich weiß ein Exempel von 8 ganzen Tagen), ehe der Ausschlag selbst sichtbar wird; besonders wird er durch vieles Nasenbluten zurückgehalten; jedoch ist er auch oft schon in den ersten 24 Stunden der Krankheit auf der Haut. Im Nesselfieber ist gemeiniglich das Exanthem früher da, als das Fieber selbst, oder gewiß doch allezeit in den ersten 12 Stunden schon sichtbar.

d) Der Ausschlag selbst ist bey genauerer Untersuchung von einander unterschieden. Bey Masern sind es rothe, über der Haut ein wenig erhabene Flecken; bey Nesselfieber mehr blaßrothe. Dort bildet sich allmählig gegen das Ende des Fiebers ein kleiner fast unmerklicher kleyenartiger Punkt; es entstehet eine Art von Abschilfern, oder leichten Abschuppen; hier, im Nesselfieber, verliert sich der Ausschlag völlig, so wie ohne Pustulation, also auch ohne alles Abschuppen, ohne alle Borke &c. Ueberhaupt muß man, um den Unterschied herauszubringen, den Ausschlag nicht so wohl sehen als fühlen, oder ihn mehr

mit

mit dem Finger als mit einem Mikroskop untersuchen; alsdann entdeckt man im Nesselfieber eine ungleich stärkere umschriebene Härte, und größere Erhabenheit über der Haut; die Inseln, wenn ich diesen groben Vergleich machen darf, um vielleicht einigen verständlicher zu werden, haben im Nesselausschlage ein steileres Ufer, in Masern ein flacheres; dort machen sie mehr einen schroffen Granitfelsen, hier ein allmählig angeschwemmtes Flötz- und Kalkgebirge; sie verhalten sich, um mehr die Sprache der Aerzte zu reden, wie phlegmone zu erysipelas.

e) Das peinliche Brennen und Jucken des Nesselausschlages fehlt bey Masern gänzlich.

f) So wie der Nesselausschlag verschwindet, ist auch zugleich die ganze Krankheit, Fieber ꝛc. gehoben, und wer bis dahin noch zweifelhaft gewesen ist, kann alsdann entscheiden; bey Masern sind die Folgen oft schlimmer als die Krankheit selbst, und besonders den Augen und der Lunge gefährlich. Freylich würde es dem praktischen Arzte sehr unnütz werden,

wenn

wenn er eine Krankheit erst am Ende derselben und aus ihren Folgen kennen lernen sollte; aber es ist ihm doch oft alsdenn noch nothwendig und wichtig, weil er nachher befragt werden kann: ob das Kind die wahren Masern gehabt habe, und die Eltern über die Gefahr einer künftigen Ansteckung beruhigen muß.

g) Das Gesicht schwillt bey Masern niemals so sehr auf; es hebt sich niemals die ganze Haut desselben, so wie in einem hohen Grade des Nesselfiebers.

h) Nesselausschlag verschont keinen Theil der Haut; Masern lassen jedoch gewöhnlich die härtere Haut der Fußsohlen und inwendigen Hände frey.

i) Die Masern siehet man freylich oft sporadisch, aber gemeiniglich sind sie an einem Orte herrschend oder epidemisch; vom Nesselfieber weiß ich kein einziges Exempel aus meiner Erfahrung und Lectüre, so daß ich zweifle, ob andre Beobachter eine Epidemie davon bemerkt haben.

N.

N.

Dysphagia; das beschwerliche Schlingen, als idiopathische Krankheit des Oesophagus.

1) Von verringerter Capacität desselben.

2) Von einem Hindernisse krampfigter Art.

3) Von einem paralytischen Zustande desselben; und einer Erschlaffung der Häute des Pharynx.

§. 105.

Unter den fast unzählbaren Hindernissen des Schlingens, welche die Leser theils aus eigener Erfahrung kennen, theils bey den Verfassern anatomischer Pathologien, Nosologien ꝛc., vorzüglich bey Ploucquet ꝛc., gesammelt finden können, hebe ich bloß einige chronische unsichtbare, als idiopathische Krankheiten des Oesophagus, zu meinem Endzwecke aus, da die übrigen, welche größtentheils, dem Auge oder Finger des forschenden Arztes erreichbar, in der Höhle des Mundes, im und am Halse, im Schlunde ꝛc. liegen, es ungleich weniger Mühe kostet kennen zu lernen, und sie von andern zu unterscheiden. Die 3 — 4 verschiedenen Arten des beschwerli-

chen Schlingens, auf welche sich jetzt meine Betrachtung allein einschränkt, habe ich selbst beobachtet, und das Folgende ist also auch hier wieder, so wie in diesem ganzen Werke, Resultat meiner eignen Erfahrung, mit der von andern Beobachtern verbunden. Ein Bruchstück dieser Art, so wie ich dergleichen vorhin auch immer nur geliefert, und nichts vollständiges, die ganze Materie erschöpfendes, versprochen habe, wird hoffentlich auch nicht ganz den Nutzen verfehlen, den ich dabey zur Absicht habe.

Der Arzt von Gefühl sieht immer höchst ungern einen seiner Kranken auf irgend eine Weise sterben, aber ich denke, einen, nach dem Buchstaben, Hungers sterben zu sehen, muß ihn wol am meisten erschüttern; und das geschieht bey dem unglücklichen Ausgange der jetzt zu betrachtenden Krankheiten. Mögte ich doch durch meine gegenwärtige Arbeit entfernt etwas dazu beytragen können, ihm diese schreckliche Scene zu ersparen! Eine genauere Kenntniß der Ursache eines solchen bejammernswürdigen Leidens bringet ihn hoffentlich auch der Heilung viel näher.

Wenn es mir auch nicht glücken sollte, hier bey den verschiedenen Ursachen, wodurch der Mechanismus des Schlingens gestört wird, mit der Schärfe und Genauigkeit eine Grenzlinie zu ziehen, wie bey einigen vorhin untersuchten Krankheiten, so wird es doch nicht ganz überflüssig seyn, den Leser bloß auf die große, mögliche Verschiedenheit derselben aufmerksam zu machen, und die Krankheiten selbst so genau als möglich zu beschreiben, um sie denn trennen zu können.

Der Gang dieser Krankheit ist so gleichförmig bey diesen 3 verschiedenen Arten, daß man sie bey oberflächlicher Untersuchung immer für eine und dieselbe halten muß. Man sieht nämlich die Organe der Deglutition leiden, und ein Hinderniß im Schlucken entstehen, das geschwinder oder langsamer zunimt, und, wenn der Ausgang nicht glücklich ist, sich auch immer auf dieselbe Art endiget: — es geht zuletzt nichts mehr in den Magen hinunter. In zweyen dieser Fälle entsteht das Uebel sehr langsam, unmerklich und allmählig, ohne daß der Kranke auf-

merk-

merksam darauf wird, und es der Mühe werth hält, es einem Arzte anzuzeigen, zumal wenn er keine Schmerzen dabey empfindet, und die Beschwerde im Schlingen oft sich anfänglich wieder zu verlieren oder eine Zeitlang zu verringern scheint, und ihn bey seinem übrigens guten Befinden also sicherer macht, besonders bey der krampfigten Art.

Ich darf also bey dieser Gleichförmigkeit nicht erst jede Art besonders beschreiben, und einzeln bey allen wiederholen, daß die Krankheit sich mit einem gelinden Erbrechen anfange, das allmählich zunimt ꝛc. Aber der Anfang ist doch bey allen nicht genau derselbe; auch sind im Verlaufe der Krankheit einige sehr wesentlich unterschiedene Phänomene da; diese muß ich genau angeben.

§. 106.

Alle die auf dem Titel bezeichneten Arten dieses Uebels lassen sich, ob man gleich, so weit das Auge reicht, in der Höhle des Mundes ꝛc. nichts außerordentliches entdecken kann, gar bald aus

dem

dem Erbrechen erkennen, womit sie gewöhnlich anfangen, aus dem vomitu oesophagaeo, das kein wahres Erbrechen ist, sondern im eigentlichsten Verstande eine Art von Wiederkäuen, Rumination. Die Speisen verlieren sich nämlich aus der Höhle des Mundes, und scheinen den gewöhnlichen Weg nach dem Magen zu nehmen, aber sie kommen bald, ohne alle Anstrengung des Magens, des Zwerchmuskels, der Bauchmuskeln ꝛc., wieder in den Mund, wie bey wiederkäuenden Thieren; der Kranke sucht sie auch eben so wieder hinunter zu schlucken, welches ihm im Anfange bey öfterer Wiederholung zwar gelingt, aber allmählig immer schwerer wird, so daß jedesmal alsdenn die Speisen mit großer Leichtigkeit in den Mund und aus demselben heraus stürzen; immer mit viel Schleim vermischt.

Ich habe Kranke gesehen, bey denen es bloß bey dieser Rumination eine lange Zeit blieb, und die, des ekelhaften Wiederkäuens nicht müde, viele Jahre unbesorgt zubrachten, weil sie durch öfteres Wiederkäuen, ohne großen Aufwand von

Kräften, zuletzt immer dahin kamen, daß das Genossene endlich in kleinen Portionen die Speiseröhre hindurch gieng, und zuletzt nichts weiter im Munde zurückblieb, das sie hätten auswerfen müssen.

Jene anfängliche Rumination, die ohne alle wiederholte Anstrengung der Bauchmuskeln gewöhnlich sehr geschwind und nur einmal erfolgt, und bloß durch die Bewegung der Muskular Fiebern des Oesophagus entsteht, unterscheidet diese Erscheinung bald von einem gewöhnlichen Erbrechen. Die Kranken haben außerdem auch keine große Angst, keinen kalten Schweiß ꝛc. als die gewöhnlichen Vorläufer eines wirklichen Erbrechens, womit die Speisen aus dem Magen selbst herauskommen; auch keine Uebelkeit, sondern vielmehr guten Appetit zum Essen, ob sich gleich zuletzt, wenn die Dysphagie in wahre Aphagie übergeht, das eigentliche Gefühl von Hunger verringert, wie am Ende einer jeden andern Krankheit.

So weit kommen also alle die von mir bezeichneten Arten dieses Uebels mit einander überein,

ein, und die Form weicht so wenig von einander ab, daß sich dergleichen nicht leicht verkennen läßt. Aber folgende Umstände verdienen doch die größte Aufmerksamkeit.

§. 107.

Ich habe bey Gelegenheit des beschwerlichen Urinirens, §. 88 S. 17, erinnert, wie gewöhnlich es sey, daß die Häute im menschlichen Körper sich verdicken, verhärten, und habe dieses unter andern mit einer Krankheit der Urinblase bewiesen. So wie dort die ganze Function des Organs dadurch gestöhrt, und zu einer großen Krankheit Anlaß gegeben wird, so geschieht es auch zuweilen hier auf dieselbe Art in der Speiseröhre. Indem sich die innere Haut derselben (tunic. propr. oesoph.) allmählig verdicket, wird dadurch auch zugleich die Muskelhaut, ob sie gleich dicker ist als die des Magens und der Gedärme, in ihrer großen Muskelkraft geschwächet, und wenn auch gleich nicht der ganze Canal auf diese Art gänzlich verwächset, und der Durchgang nach dem Magen gehemmt wird, so wird doch die Capacität immer mehr allmäh-

allmählig verringert, und das Schlingen eben so sehr erschweret, da die Speisen nicht bloß vermöge ihrer Schwere ꝛc. in den Magen gelangen, sondern, wie bey der Urinblase der Detrusor urinae und die Muskularhaut gehindert werden sich zusammenzuziehen, den Urin fortzudrücken u. s. w., auch hier etwas ähnliches geschiehet.

Es ist jedoch die Verengerung der Speiseröhre aus dieser Ursache selten, und weit seltner als die oben beschriebene Verdickung der Harnblasenhäute. Gewöhnlicher ist die Verengerung der Speiseröhre durch irgend eine Verhärtung, Scirrhosität oder dergl., nicht der ganzen Länge nach, sondern, wie Bleuland unter andern beschrieben hat, an irgend einer Stelle derselben veranlasset, und noch weit gewöhnlicher durch irgend eine vergrößerte Drüse, einen Druck außerhalb der Speiseröhre, oder durch einen großen organischen Fehler in der Nähe derselben, hervorgebracht.

Nun aber durch diagnostische Zeichen und Merkmale bestimmen wollen, ob bey wirklich entdeckter Verengerung der Speiseröhre, und verrin-

ringerter Capacität, die Muskelhaut verhärtet oder verdickt, und so ein großer Theil dieses Canals beenget worden, oder ob außerhalb des Canals durch irgend eine vergrößerte Drüse in der Nähe, oder durch ein ähnliches Uebel die Speiseröhre zusammengedrückt werde, und auf diese Art das Hinderniß im Schlucken entstehe: das hieße, wenn es auch wirklich möglich wäre, in unnütze Mikrologie sich verlieren, und das kann auch wol nicht anders als erst nach dem Tode eines solchen Kranken anatomisch genau bestimmt werden.

Es wäre aber auch selbst dem praktischen Arzte diese Subtilität überflüssig, weil auf die verschiedenen Hindernisse dieser Art, die Verhärtungen, Scirrhositäten, Verdickungen ꝛc. eben dieselben Mittel anwendbar bleiben, die er bey einer Vergrößerung einer Drüse außerhalb der Speiseröhre anwenden wird, sobald er nur Ueberzeugung genug hat, daß die Verengerung des Canals nicht etwa durch eine Vomica oder dergleichen in der Nähe hervorgebracht wird, als welches man auch zuweilen in den Leichen entdeckt hat.

Von den zu untersuchenden Hindernissen des Schlingens ist das das häufigste, welches ich unter Nr. 1. angegeben habe, wo nämlich die Speiseröhre auf eine oder andre Art beenget wird und nichts durchlässet, so daß der in diesem Fache sehr erfahrne englische Wundarzt Wathen vermuthet, in 10 Fällen liege 9mal der Grund in einer vergrößerten Drüse, in der Nähe dieses Canals, vorzüglich der Thyreoidea (Memoirs of the medical society. Vol I.); auch behauptet es besonders von dieser Drüse der Holländer van Geuns.

Hier hat der Kranke eben so wenig, als bey den andern Arten des verhinderten Schlingens, einen wirklichen Schmerz, sondern mehr Druck und Spannung, entweder nach der Lage der Speiseröhre hinunter, oder nach den Schulterblättern hinauf. Er weiß die Stelle in derselben genau anzugeben, wo er gleichsam einen Pfropf zu fühlen glaubt, und empfindet den Widerstand sehr deutlich. Je weiter er diesen Widerstand nach untenhin angiebt, desto gewisser kann der Arzt von der Verhärtung rc. in der Speise-

röhre seyn. Diese unangenehme Empfindung vom Druck oder Spannung breitet sich zuweilen bis nach dem obern Magenmunde aus, und die Verhärtung, Verengerung, und gar Verknorpelung desselben, gehört allerdings mit zu diesem Uebel, das übrigens leicht von der Verhärtung des untern Magenmundes zu unterscheiden ist.

Hat der Kranke hier noch genauer den Ort, wo er das Hinderniß fühlt, bestimmt, in der Gegend des 4ten oder 5ten Rückenwirbels, so ist es noch wahrscheinlicher, daß eine oder mehrere Drüsen, welche daselbst in der Nähe des Oesophagus liegen, und vorzüglich von Vesalius kenntlich gemacht sind, sich verhärtet oder vergrößert haben, und diesen Canal von außen zusammendrücken, wie Nahnys auch glaubt. Die Empfindung von stumpfen Schmerzen oder Spannung hat der Kranke hier nicht allein bey dem Schlingen, sondern auch außer der Zeit, welches bey den andern beyden Arten dieser Krankheit nicht Statt findet.

Ein distinctives Zeichen von dieser Art Dysphagie, welches ich glaube bey einem übri-

gens

gens robusten und gesunden Officier entdeckt zu haben, und worauf ich die Leser aufmerksam zu seyn bitte, da ich es von keinem andern Beobachter angemerkt finde, ist, wenn das Hinderniß im Schlingen bey der Lage des Kranken auf dem Rücken sich verliert, worüber man unten, bey Gelegenheit einer Krankheitsgeschichte von einem Kinde, S. 175, noch mehr beygebracht findet.

Von allen Arten der Dysphagie ist diese, so wie die häufigste, auch die heilbarste; und wer von diesem Uebel so glücklich gewesen, einen Kranken zu retten, der kann immer vermuthen, daß es diese oder die krampfigte Art desselben gewesen ist.

Bey der Art vom verhinderten Schlingen Nr. 1. kommt im Anfange von den genoßnen Speisen, spät nach dem Genusse, etwas wieder in den Mund, oft, wie bey Farquarsonds Kranken, erst nach 4—5 Stunden *); bey zunehmendem Uebel aber früher, in größerer Menge, und, je mehr sich der Kranke seinem Ende nä-

*) Memoirs of the medical Society etc. II. 560.

nähert, desto geschwinder, zuletzt fast im Momente des Schlingens — alles.

Man hat bisher geglaubt, unter andern van Geuns, daß die Jugend von diesem Uebel frey sey; Percival hat aber ein Kind von 13 Jahren davon befreyet, das schon einem Skelette ähnlich geworden war*). Ich wüßte auch nicht, was sie davor sichern sollte, da ohnehin das Drüsensystem so leicht bey ihnen leidet. Ich selbst habe 3 Kinder in dem Alter von 3 — 8 Jahren daran leiden sehen, wo bey dem einen das Erbrechen über ein Jahr fortdauerte, und da endlich sich verlor. Von den andern beyden füge ich hier die Krankheitsgeschichte bey. Ein Knabe von etwa 7 Jahren (sehr sonderbar! ein Enkel des Kranken, dessen tödtliche Dysphagie in den Göttingischen gelehrten Anzeigen. 1783. St. 203 von Dr. Marx beschrieben worden, und dessen Krankengeschichte ich unten noch berühren werde) hatte wahrscheinlich schon Jahre lang unbemerkt dies Widerkäuen gehabt, denn als man endlich aufmerksam darauf wurde, brachte er

*) Medical Transactions. II. 90.

er die Speisen nie aus dem Munde, sondern schluckte so lange, bis nichts weiter in der Höhle des Mundes zurückblieb, und zuletzt alles in den Magen kam. Der Körper fieng an merklich abzuzehren, ohne daß man sonst eine Ursache davon auffinden konnte, außer etwa verhärtete Drüsen, besonders des Gekröses. Der Knabe holte zuweilen tief Athem, zeigte eine Stelle der Brust, unter der rechten Warze, die ihm schmerzhaft war, klagte aber nicht über eigentliche Uebelkeit, und hatte auch kein eigentliches Erbrechen mit Anstrengung der Bauchmuskeln rc. Ich ließ ihn klares Wasser nüchtern trinken, und eine Stunde nachher Chocolade; sogleich nach dieser brachte er klare wässerigte Feuchtigkeit mit Schleimstücken, ohne Chocolade, heraus. Dies geschahe eben so mit Kaffee, der auch allezeit zurückblieb. Nachdem er 4 Wochen alle Abend ein halbes Gran Calomel genommen, und sich nichts darauf verändert hatte, ließ ich ihn Seifenpillen mit Schierlingsextract nehmen, und Emplastr. sapon. B. mit Schierlingspflaster malaxirt, in die Herzgrube legen; dabey mußte er jedesmal, sogleich nachdem et etwas genossen

hatte,

hatte, in einer horizontalen Lage eine Stunde ruhig liegen. Diese mechanische Hülfe that Wunder, und ich muß dieser so sehr als dem Mercurial-Mittel die Genesung zuschreiben.

Der andere Knabe von 4 Jahren durfte oft nur einen einzigen Zwieback, oder des Mittags bloß die Suppe genossen haben, so kam, ohne alle vorhergehende Uebelkeit oder Neigung zum Erbrechen, etwa ein guter Löffel voll des genossenen wieder herauf. Das Kind war übrigens wohl, klagte über nichts, und hatte jenes Wiederkäuen schon 14 Tage, als die Eltern aufmerksam darauf wurden. Hier äußerte sich aber das Heraufkommen aus der Speiseröhre nicht bey jedem Genusse von Speisen, nicht alle Tage, nicht zu gewisser Zeit des Tages. Man hätte glauben sollen, der Magen sey nur zuweilen überladen, und so sehr angefüllt, daß ein Theil der Speisen, wie man alsdann gewöhnlich erfährt, wenn man sich niederbeugt, wieder heraufkäme. Dies Kind behielt dies Erbrechen 6 Wochen, zuletzt alle Tage, und wurde endlich, durch den pünktlichen Genuß kalter Speisen und

Getränke hergestellt, worauf ein intermittirendes Fieber erfolgte.

Ich weiß diese Rumination, wenigstens bey dem ersten Knaben, nirgends hinzubringen, als unter die Art des Uebels, welche ich mit Nr. 1. bezeichnet habe, wäre es auch nur aus der Wirkung der angewandten Mittel, daß ich daraus schließen muß.

Dies leitet mich auf die therapeutische Behandlung dieser Krankheit, und auf die Betrachtung der verschiedenen dabey anzuwendenden Mittel, die ich, wenn man sie gleich, nach dem mir vorgezeichneten Plane, hier nicht erwarten wird, doch desto nothwendiger bey dieser Gelegenheit finde, da die Kenntniß der so ganz verschiedenen Mittel unglaublich wichtig ist, welche in einer Art des beschwerlichen Schlingens von Nutzen sind, und in einer andern nachtheilig seyn müssen; zugleich dies auch die große Verschiedenheit der Ursachen beweiset, und auf diese Art a posteriori für die Diagnostik unentbehrlich wird. Ueberhaupt gerathen wir ja leider oft in den Fall, daß wir erst aus der Wirkung der

Arzneyen eine Krankheit näher kennen lernen, und unsre Diagnostik bereichern.

Die große Wirkung des Quecksilbers in der Dysphagie ist freilich von Ruysch, dem berühmten Zergliederer, schon bemerkt worden; da aber die dadurch gehobene Beschwerde im Schlingen keine eigentlich idiopathische Krankheit der Speiseröhre war, sondern in äußerlich sichtbaren vergrößerten Drüsen bestand, welche diesen Canal zusammendrückten, so kann man ihm auch die Ehre der Entdeckung streitig machen, weil schon lange vor ihm der Nutzen dieses Mittels bey solchen Drüsen-Krankheiten bekannt war. Aber bey unsichtbarer Ursache der wahren Dysphagie ist es eine Entdeckung der neuesten Zeiten, besonders der Engländer Brisbane, Munkley rc., welche sich bis jetzt noch immer bestätiget. Eine der letztern Beobachtungen finde ich von 1796 in den schwedischen Annalen, B. I. St. II. S. 165.

Dieses in so vielen andern Krankheiten wunderthätige Mittel leistet auch hier alles, was man je erwarten kann, wenn man den Fall ge-

nau unterscheidet, auf den es allein paßt, nämlich hier auf die so eben beschriebene Art des erschwerten Schlingens (Nr. 1.); da hingegen es bey den 2 übrigen Arten nicht nur unnütz, sondern schädlich ist. Das Hauptmoment macht also auch hier wieder bey der Cur eine gute Diagnostik aus.

Ich darf die vielen Beobachtungen, welche man von dieser Wirkung des Quecksilbers aufgezeichnet findet, hier nicht alle anführen. Aber dem nicht belesenen muß ich doch bemerklich machen, daß die holländischen Aerzte sich um diese Krankheit sehr verdient gemacht haben, und die Beobachtungen von van Geuns, Bleuland, Nahuys ꝛc. wegen ihrer größern Erfahrung stärker interessiren, da in ihrem Lande sich jetzt diese Krankheit häufiger als ehedem äußert. Inzwischen sind die Bemerkungen der Engländer, bey denen dies fürchterliche Uebel nicht weniger zu Hause ist, eben so lehrreich. Auffallend ist es dagegen, daß man in Deutschland so wenig über dasselbe bekannt gemacht siehet, wenn es an andern Orten so wenig selten ist als in Hannover, und da Sömmerring es

in

in unsern Zeiten doch auch, so wie in Holland, häufiger glaubt.

Man hat allerley Präparate des Quecksilbers in dieser Krankheit mit Nutzen gegeben. Johnstone hat selbst mit dem Sublimare sie geheilt (Memoirs of the med. Society. II. 180.), so wie auch schon mein ehemaliger scharfsichtiger Freund Wagler zu Braunschweig im Jahre 1773, noch ehe man die Wirkung dieses Mittels so genau als jetzt kannte, und es sich noch nicht so sehr in der Erfahrung bestätigt hatte. Ich theile daher seine Beobachtung aus einem Briefe an mich hier, auch deswegen als eine Merkwürdigkeit, mit: „Bey meiner „Rückkunft bekam ich eine Schusterfrau in die „Cur, die seit 7 Monaten an einer degluti„tione difficili und endlich in dem Grade „impedita litt, daß sie seit einigen Wochen nur „noch Flüssigkeiten hatte mühsam hinunterbrin„gen können. Sie war schwach, abgezehrt, „und hatte schon ein schleichendes Fieber. Ich „erschrak über das Elend und zitterte wegen der „Folgen; doch setzte ich noch einiges Vertrauen „auf des Pocken-Hoffmanns pilulas

„ma-

„majores aus dem Sublimate, die Jacobi
„beschrieben hat. Dieser wurden täglich 3mal
„3 Stück aufgelöset genommen; und nach 12
„Tagen aß meine Kranke wieder auf einmal ein
„Stück Apfel, ein Butterbrodt und warm Bier
„mit einem Zwiebacke. Die Fähigkeit zu schlin-
„gen besserte sich täglich. In 8 Tagen darauf
„gieng die Frau wieder umher, ließ ihr Bette
„aus der Stube bringen, und wagte sich wieder
„in die Luft. Die Arzney machte keinen Spei-
„chelfluß, sondern ein gelindes Laxiren ohne
„alle Beschwerde."

§. 108.

Nach dieser vielleicht zu großen Ausschwei-
fung in das Gebiet der Therapie kehre ich zur
Betrachtung der 2ten Art der Dysphagie, die
ich auf dem Titel genannt habe, zurück.

Diese vom Krampfe in dem Oesophagus
entstehende Beschwerde weichet von der ersten
Art darin ab, daß es

1) zuweilen, besonders gegen Abend, einen Nach-
laß giebt, wo der Kranke leichter schluckt;

ob-

obgleich bey zunehmendem und im Anfange verkannten Uebel die Schwierigkeit ununterbrochen fortdauert, wie bey andern Arten desselben. Es ist also wichtig, den Ursprung und Gang sogleich im Anfange zu erforschen.

2) Das Hinderniß im Schlingen fühlt der Kranke gemeiniglich unten in der Speiseröhre, in der Nähe des Magens, so daß sich selbst von da aus die unangenehme Empfindung bis nach dem Magen selbst hin verbreitet. (Man darf hier bey Frauenspersonen den sogenannten globum hystericum nicht vergessen.)

3) Die Schwierigkeit im Schlingen entsteht hier gemeiniglich plötzlich, und sogleich dringend, mit großer Beschwerde; da hingegen bey den andern Arten, von Verhärtungen ꝛc., entstehend, dieselbe sehr leicht, und fast unmerklich, anfängt, und so auch allmählig, langsam, oft Jahre lang fortdauert, oder zunimt.

4) Warmes Getränk geht hier leichter durch die Speiseröhre hindurch als kaltes.

5) Wenn flüssige Sachen langsam genossen werden, so gelangen sie ohne Hinderniß in den Magen; aber geschwind, oder in großer Quantität auf einmal getrunken, kommen sie sogleich wieder in den Mund herauf.

6) Selten ist dieser krampfigte Zustand allein auf den Hals, den Schlund oder die Speiseröhre eingeschränkt, sondern man bemerkt zugleich mehrere krampfigte Beschwerden in andern Theilen des Körpers; wie man unter andern aus folgender Beobachtung wahrnehmen wird, wo sich die Beschwerde nicht nur durch die völlige Apyrexie von allen ähnlichen Zufällen acuter Art unterschied, sondern auch im Halse, in der Höhle des Mundes, so weit man hineinsehen konnte, so wenig von Geschwulst, Röthe oder dergleichen, als äußerlich Geschwulst von Drüsen ꝛc. sichtbar war. Wenn bey dieser Frauensperson von 15 Jahren nur etwas Flüssiges die Epiglottis berührte, entstand eine unangenehme Empfindung, und es mußte wieder ausgespuckt werden, so daß nur wenig in den Oesophagus hinunter kam.

kam. Zugleich war aber auch, wenn dieses wenige hinunter kam, eine Art von Aufstoßen oder von Schlucksen (ructus, singultus) merklich, ohne Neigung zum Erbrechen. Die Finger wurden von Zeit zu Zeit ohne bekannte Veranlassung krampfhaft zusammenzogen. Dann entstand wieder einmal zu einer andern Zeit ein krampfigter Husten von kurzer Dauer; zuweilen ein Irrereden von einigen Stunden, auch wohl Verdunkelung des Gesichts; abwechselnd leichte Leibschmerzen; zuweilen eine Spur von Reinigung, die mit jenen Schmerzen wahrscheinlich in Verbindung stand, übrigens aber schon bey dieser Kranken völlig in Ordnung war. Alle diese Erscheinungen verloren sich, bey dem Gebrauche bloß krampfstillender Mittel und eines spanischen Fliegenpflasters im Nacken, innerhalb 12 Tagen wieder, und die Kranke fieng allmälig wieder an, flüssige und feste Nahrungsmittel frey hinunter zu schlucken. Eben dieselbe Kranke wurde im folgenden Jahre auf eine weit heftigere Art von jenen Beschwerden befallen, und gerieth würklich in Gefahr, woraus ich

sie

sie zuletzt mit Campher und Moschus in großer Gabe, einem Zugpflaster in der Herzgrube ꝛc. rettete, dergleichen starke Mittel ich bey dem ersten Anfalle nicht nöthig gehabt hatte.

So behandelte Johnstone eben denselben Zufall, wo die Kranke so wenig feste als flüssige Speisen hinunterbringen konnte, mit krampfstillenden Mitteln (15 Tropfen von der Thebaischen Tinctur, alle 4 Stunden gegeben), und nach der 6ten Gabe verlor er sich auf immer. (Memoirs of the med. society. II. 181.)

Wie leicht dieser krampfigte Zustand den Arzt täuschen, und ihn glauben machen könne, bey der langen Dauer desselben liege ein anderer zum Grunde, beweiset der Fall, den Zimmermann in den Act. helvetic. Vol. II. p. 94 beschreibt, wo er sogar ein schon 5jähriges Hinderniß im Schlingen bey einer hysterischen Frauensperson so glücklich war durch äußere krampfstillende Mittel, Cataplasmen ꝛc. zu heben, ob es gleich von andern Aerzten für unheilbar erklärt worden.

§. 109.

§. 109.

So bald man sich von der Möglichkeit einer krampfigten Beschwerde in der Speiseröhre überzeugt hat (und dies darf ich nicht nur nach den so eben erzählten Geschichten und angegebenen Zeichen erwarten, sondern auch aus der Structur der Speiseröhre ist es schon evident), so wird man auch leicht die Möglichkeit eines ganz entgegengesetzten Zustandes, einer paralytischen Beschwerde der Muskelhaut, annehmen müssen. Es lassen sich wenigstens einige Erscheinungen bey der Dysphagie nicht anders als auf diese Art erklären, und die Heilart bestätiget die Richtigkeit dieser Aetiologie außerdem, wenn man auch vergäße, daß die Leichenöffnungen allein schon hinlänglich beweisen, daß dieses nicht bloß theoretisches Raisonnement sey; denn hier hat man die Speiseröhre zuweilen, ihrer ganzen Länge nach, durchaus offen, und von natürlicher Beschaffenheit, und ganz und gar nichts widernatürliches oder kein mechanisches Hinderniß in derselben gefunden. (Schmalz chirurg. und medicin. Vorfälle ꝛc.)

Es

Es ist dieses die Art des beschwerlichen Schlingens, welche ich unter Nr. 3. aufgeführt habe, und bey der man folgende Phänomene wahrnimt:

1) Dieser Art von Dysphagie sind vor allen alte Leute ausgesetzt, ohne zu erinnern, daß sie außerdem auch zuweilen eine Folge einer Apoplexie ist.

2) Der Kranke bringet festere Speisen leichter als flüssige hinunter; und die Ursache ist leicht physiologisch zu erklären.

3) Der Kranke weiß hier nicht bestimmt anzugeben, an welcher Stelle des Oesophagus sich das Hinderniß findet.

4) Er hat gar keinen Schmerz, auch nicht einmal einen stumpfen, oder das Gefühl von Spannung, Druck rc., wie in Nr. 1.

5) Die Sonde entdeckt auch schon bey Lebzeiten des Kranken, wo sie angebracht werden kann, keinen Widerstand. Nur traurig, daß dieses Sondiren überhaupt so große Schwierigkeit mit sich führet! Was würde man sonst

nicht

nicht von der geübten leichten Hand und dem feinen Gefühle eines Wundarztes zu erwarten haben, die oft auch das Hinderniß selbst unterschieden? Bey der Anwendung der Bougies, welchen man mit Migliavacca den Nutzen nicht absprechen kann, finden sich noch größere Schwierigkeiten.

Man sollte nicht glauben, wie leicht diese Art von Dysphagie mit der ersten zu verwechseln ist, wo es ein wirklich mechanisches Hinderniß im Schlucken giebt. Van Geuns erreichte bey einer solchen Kranken, die anderthalb Jahre schon gelitten hatte, und deren Krankheit für eine Verhärtung der Drüsen ꝛc. von 3 andern Aerzten angesehen und behandelt war, seine Absicht mit Arzneyen, die nichts weniger als geeignet sind, verhärtete Drüsen zu zertheilen. Eben so befreiete Tode einmal einen Kranken von dieser Beschwerde im Schlingen bloß durch einen Aufguß von Quassia. (Collectan. hafniens. vol. I. p. 205.) Ich habe selbst in einem solchen Falle die glücklichste Wirkung von großen Gaben Quassia-Extracts erfahren, wo der übrigens

gens

gens sehr gesunde rothbackigte Kranke am untern Theile der Speiseröhre, oder am obern Magenmunde das Hinderniß im Schlingen zu empfinden glaubte, schon einige Wochen daran gelitten hatte, aber noch nicht so sehr, daß die Speisen wieder in den Mund herausgekommen wären, wie ich bey der längern Fortdauer jener Beschwerde hätte befürchten müssen.

Ich gestehe, daß ich mir hier keine andere Erklärung von der guten Wirkung dieser bittern Mittel zu machen weiß, als daß ich sie etwa für bloß excitirend ansehe, und annehmen muß, daß das Hinderniß im Schlingen in dem Falle mehr von Erschlaffung der Muskular-Fibern und einer anfangenden Lähmung, als von Vergrößerung der Drüsen entstanden sey, die, wenn man ihr Zeit gelassen hätte, in ein gefährliches Uebel übergegangen wäre.

Vielleicht dient folgende Krankengeschichte, ob sie gleich nicht zu der chronischen Dysphagie gehöret, dazu, die Entstehung der Art Nr. 3. zu erklären:

Ein starker gesunder Mann wurde, als er, nach seiner Angabe, mit großem Appetit einen großen Bissen, fast ungekauet, geschwind verschluckte, plötzlich von einem Hindernisse im Schlingen so befallen, daß ihm jener Bissen erst oben in der Speiseröhre, nachher im obern Magenmunde schien fest geblieben zu seyn. Er empfand zwar nirgends einen Schmerz; aber bald darauf wurde das Schlucken gänzlich gehemmt; und wenn er auch nur einen Eßlöffel voll flüssiges genoß, gieng dies zwar tief in den Oesophagus hinunter, aber bald darauf stürzte es, ohne Erbrechen, in den Mund wieder herauf. Dieser Zustand dauerte bis an den folgenden Morgen ohne alle schmerzhafte Empfindung. Von flüssigen Dingen gieng nichts in den Magen hinunter. Am folgenden Mittage, da ich vorher Zucker, mit dem Hofmannischen Liq. anod. begossen, oft hatte im Munde langsam zerfließen lassen, schien es, als wenn die Probe, gekochten Salat hinunter zu bringen, gelang, und sich nun das Hinderniß unten in der Speiseröhre plötzlich verloren hätte; der Weg blieb seit dem auch natürlich offen. Der Kranke trank in mei-

meiner Gegenwart ein Glas Wein wieder mit natürlicher Leichtigkeit.

War wirklich hier jener Bissen unten im Oesophagus sitzen geblieben? Ich zweifle, weil er alsdenn lebhaftere Schmerzen würde erregt haben. Wahrscheinlicher entstand durch gar zu große Ausdehnung des Oesophagus ein paralytischer Zustand, weil auch, wie immer in einem solchen Falle, flüssige Dinge nicht hinunter giengen.

§. 110.

An diesen Zustand grenzet ohne Zweifel die auf dem Titel aufgeführte Art der Dysphagie von erschlafften Häuten des Pharynx und Falten des Oesophagus. Ein schreckliches Uebel, das, wenn wir gleich bey den andern Arten immer noch Hoffnung zur Genesung haben, und wirklich in den gefährlichsten Fällen glücklich gewesen sind, doch immer noch bisher unheilbar geblieben ist! Aber es gehört, Gott Lob! unter die sehr seltnen Krankheiten. Es ist mir in 40 Jahren meiner Erfahrung nur erst 3mal vorgekommen.

Da

Da die innere Haut der Speiseröhre ungleich weniger elastisch, sondern mehr nachgebend ist, als die Muskelhaut, so entstehen in derselben auch leicht wirkliche Falten. So sahe Baillie eine tödtliche Dysphagie und Verengerung der Speiseröhre allein daher entstanden, daß sich eine unordentliche Faltung der inneren Membrane gebildet hatte, wobey die muskulöse Haut gesund geblieben war (Ausgabe von Sömmerring S. 51.), und man findet ähnliche Fälle von andern aufgezeichnet. Gewöhnlicher aber bildet sich höher herauf im obern Theile der Speiseröhre, im Schlundkopfe durch Erweiterung oder große Ausdehnung der Häute, eine wahre Pharyngocele, ein Beutel, ein Oesophagus succenturiatus, ein diverticulum oesophagi, wie man dergleichen in den medical observat. et inquiries. vol. III. abgezeichnet findet, und Borsieri unter dem Namen von hernia pharyngis sehr genau beschreibt (Institut. Vol. IV. p. 292.) auch Grashnys in Act. Nr. 1. Tom. VI. obs. 73. Indem der Kranke sich bemühet die Speisen hinunter zu schlucken, drückt er

sie nicht in den Oesophagus, sondern in diesen Sack, und je mehr die nachgebenden Häute desselben durch die Speisen ausgedehnt werden, desto mehr wird der Oesophagus eben dadurch zusammengedrückt, und also der Durchgang durch diesen immer mehr erschwert, so daß zuletzt nichts mehr in denselben hineinkommt.

Diese am obern Theile der Speiseröhre oder am Schlundkopfe sich bildenden Falten sind anfänglich so klein, daß entweder bey der Mahlzeit, oder oft nach einigen Stunden, zuweilen erst am folgenden Tage, wenige Ueberbleibsel von Speisen, dem Kranken fast unbemerkt, durch eine Art von Räuspern oder geringer Anstrengung der kleinen Muskeln wieder in den Mund kommen. Der Kranke fühlt hier nicht die Lage der Speiseröhre, oder einen Druck an irgend einer Stelle derselben, wie in den andern Arten dieser Krankheit.

Es entstehet hier zuweilen bey dem Schlingen selbst, bey dem Essen, ein eigenes sonderbares Zischen, das den Anwesenden oft, dem Kranken selbst aber immer, merklich wird, und

mir

mir ein solcher aus einem Ventile erklärete, das er im Halse habe, bey dem es glücklicher Weise viele Jahre bey diesem Ventile blieb, dem aber gewiß das gewöhnliche Schicksal, Hungers zu sterben, bevorstand, wenn ihn nicht eine chronische Brustkrankheit (Phthisis aerea, emphysematica) früher aus der Welt genommen hätte, wie die Section, welche ein fremder Arzt in meiner Abwesenheit machte, genug beweiset *).

Das bey dieser Art von Dysphagie bemerkliche Erbrechen unterscheidet sich von dem oben beschriebenen merklich dadurch, daß der Kranke zwar auch anzugeben weiß, wo die Speisen sitzen bleiben, nämlich sogleich oben in der

*) „Der Pharynx, schrieb mir dieser, der oberhalb „ganz gesund war, bildete in der Gegend, wo er „in den Oesophagus übergeht, nach hinten zu, ei„nen besondern blinden Sack, der an den 6ten „und 7ten Halswirbel herabhing, und noch Ueber„bleibsel von Speisen enthielt. Dieser Sack schien, „nach dem Augenmaaße zu urtheilen, ungefähr 3 „bis 4 Unzen zu fassen, und die Haut, die ihn for„mirte, war, vermuthlich von der öftern Ausdeh„nung, sehr dünne.“

Speiseröhre; aber es erfolgt geschwind nach dem Genusse der Speisen, wenn die Krankheit einen hohen Grad erreichet hat, und der Kranke geräth auch nicht in Versuchung, sie wieder hinunter zu schlucken, und wieder zu käuen, sondern er wirft, so wie das Genossene in den Mund kommt, es sogleich aus, dem Anscheine nach in größerer Menge, als er genossen hatte, und mit sehr vielem Schleim.

Diese große Menge Schleim wird leicht begreiflich, wenn man bedenkt, daß es dazu keiner besondern Absonderung von Schleim bedarf, sondern von Speichel. Denn obgleich der Kranke dies Vermögen zu schlingen verloren hat, so behält er doch das Vermögen zu kauen; und bey dieser Gelegenheit, während des Kauens, preßt sich der Speichel in dieser Menge aus den Speicheldrüsen in den Mund, und sammelt sich im Oesophagus mit den Speisen. Eine Erklärung, welche zugleich auch dienet, die unglaubliche Menge Schleim begreiflich zu machen, welcher gemeiniglich mit einem gewöhnlichen Erbrechen, zur Freude des Kranken und des Arztes,

aus

aus dem Magen selbst kommt; — es ist fast lauter Speichel.

Diese erstauende Anhäufung von Schleim oder Speichel, welche man in dem gegenwärtigen Falle bey diesen Kranken immer antrifft, verleitete einmal einen Arzt, dem man mich zur Seite setzte, abführende Arzeneyen zu geben, und er hatte Monate lang schon dadurch versucht, den Schleim wegzuschaffen, als ich ihn mit der wahren Krankheit bekannt machte (welche die Leichenöffnung nachher auch deutlicher bewies).

Eben so unerklärbar und unverantwortlich ist es, wenn man, wie ich auch erlebt habe, den unglücklichen Kranken dieser Art den Stuhlgang befördern will, und bey ihren Klagen über Verstopfung, auch diese durch abführende Mittel oder Clystiere zu heben sucht. Wie kann der Leib offen bleiben, wenn die Speiseröhre verschlossen ist? und woher sind Excremente möglich, wenn der Kranke nichts genießet? Um die traurige Existenz solcher Kranken nur noch ein wenig zu verlängern, ihnen das bejammernswürdige Leiden erträglich zu machen, da man sie auf keine

Weise

Weise retten kann, muß man ihnen durchaus keine Arzeney geben, die ohnehin nicht mehr in den Magen gelangt, sondern Erfrischungen, wie sie sie wünschen, und Clystiere aus Bouillon und ähnlichen stärkenden Mitteln.

So thätig man sich auch bey den andern beschriebenen Arten des beschwerten Schlingens beweisen muß, so unnütz ist hier alle medicinische Assistenz.

Obgleich eine äußere Veranlassung, ein harter Körper, der in den Falten und Häuten des Pharynx ist stecken geblieben, der erste Ursprung dieser Pharyngocele seyn kann (so wie es wirklich ein Kirschkern war, der sich einige Tage im Schlunde festgesetzt hatte, wie man aus den medical observat. and inquir. weiß), so scheint sie mir bey jüngeren Leuten doch eben so oft eine Folge eines vorhergegangenen andern Hindernisses im Schlingen zu seyn. Denn indem der Kranke dieses Hinderniß zu überwinden sucht, durch beständiges Drücken und Anstrengen im Schlucken, so können eben so leicht grade dadurch erst die Häute nachgeben, und sich zu einem

einem solchen Beutel zuletzt ausbilden. Es lassen mich dieses nicht nur die ungleich häufigern Verhärtungen ꝛc. der Drüsen bey solchen Kranken vermuthen, sondern in einem solchen Falle, welchen ich selbst beobachtet, war auch wirklich die Glandula thyreoidea zugleich sehr vergrößert, und hatte wahrscheinlich schon lange vorher eine Schwierigkeit im Schlucken verursacht, dabey im Anfange, die ersten Jahre, noch immer etwas von Speisen mogte hinunter gekommen seyn, bis allmählich diese neue Beschwerde dazu kam, und beides an 20 Jahre fortgedauert hatte, ohne daß der Arzt genau damit bekannt gewesen wäre.

Höchst merkwürdig scheint es mir, daß bey einem dieser Kranken, welche ich selbst gesehen, dies Uebel nicht nur wirklich mit Husten entstanden, sondern dieser auch zugleich mit demselben fortgedauert hatte; denn daß auch bey andern Arten der schon entstandenen Dysphagie sich zuweilen ein Husten äußert, ist nichts ungewöhnliches, und läßt sich aus der Nähe des Larynx leicht erklären. Grashuis sahe diese Krankheit

heit einmal sogleich nach einem vorhergegangenen Schnupfen entstehen.

Daß übrigens diese letztere Art von Dysphagie bey alten Leuten vorzüglich zu finden sey, und wenn man über die eigentliche Art derselben und ihre Ursache noch ungewiß ist, oder keine andre diagnostische Merkmale herausbringet, man diese mit Wahrscheinlichkeit annehmen müsse, so bald man sie bey einem sehr bejahrten Manne siehet, läßt sich schon deswegen vermuthen, weil hier bey allmählig natürlich werdender Erschlaffung aller Häute und Muskeln überhaupt, auch die beschriebene Entstehung von Falten, in der Speiseröhre sowohl als im Schlundkopfe, viel leichter ist. Und wo ich nicht irre, hat man auch dieses in der Natur wirklich so gefunden.

Wie sehr wichtig aber die genaue diagnostische Untersuchung sey, ob nicht grade das Gegentheil hier Statt finde, d. i. anstatt einer Erweiterung eine Verengerung, das darf ich wohl nicht erst erinnern; beyde erfordern nämlich eine ganz entgegengesetzte Behandlung.

Ende des dritten Bandes.

Register

über alle drey Bände, nach der neuesten Ausgabe.

A.

Ansprung, s. Crusta lactea.
Angina polyposa, membran. s. häutige Bräune.
— pectoris. II, 141.
— — ihr Gang. II, 153.
— — Unterschied vom Herzpolypen. II, 211.
Angst, als Zeichen des Herzpolypen. II, 193.
Alexander vom Croup. II, 136.
Ascarides, ihre Unschuld und Wirkung. III, 81.
Astacus, besondere Krankheit davon. III, 141.
Asthma, große Verwirrung der Begriffe. II, 146.
— convulsivum. II, 160.
— periodicum acutum, s. Millars Asthma.
Ausschlagskrankheiten, arten nicht aus. I, 40.
— — Verwirrung der Begriffe davon. III, 124.

B.

Bandwurm, seine Unschuld. III, 79.
Beobachtungen der Alten, ihr Werth. I, 14. 19.
Bauchspeicheldrüse, s. Pancreas.

Bla=

Blasensteine sind selten in Hannover. III, 10.
— sind schwer zu erkennen, ungeachtet des Sondirens. III, 4.
Bleuland von der Dysphagie. III, 180.
Bianchi Urtheil über die Schädlichkeit der Intestinal-Würmer. III, 85.
Blatterrose, s. Erysipelas vesiculosum.
Blasenkrankheit, s. Pemphigus.
Blasenfieber, s. febris bullosa.
Blutfleckenkrankheit, s. Morbus maculosus.
Berdmore von Zahnarbeit. II, 15. 75.
Blutigel bey Zahnarbeit. II, 85.
Black. II, 147.
Borsieri schöne Zeichnung des Gürtels. I, 75.
— — — der Parotis. I, 135.
Botium, s. Kropf.
Brendel verwechselt Kribbelkrankheit mit Veitstanz. I, 142.
Braune vom Pemphigus beurtheilt. I, 38.
Bronchocele, s. Kropf.
Bräune, häutige. II, 103.
— — Beschreibung derselben. II, 123.
— — Unterschied von Millars Asthma. II, 130.
Brustbräune, s. Angina pectoris.
Butter von Brustbräune. II, 164.
Bohlen vom Herzpolypen. II, 208.

C.

Cantharides, s. spanische Fliegen.
Catarrhus suffocativus. II, 105.

Cathe-

Catheterisiren, Schwierigkeit dabey, woher sie entstehe. III, 30.
— wenn Blut dabey abgeht, was es bedeute. III, 39.
Chalmers vom Millarischen Asthma. II, 110.
Chorea t. Viti. I, 139.
— der Engländer, ist von dem deutschen Veitstanze unterschieden. I, 143.
— der Begriff davon noch sehr schwankend. I, 149.
— Unterschied von Kribbelkrankheit. I, 151.
Cingulum, s. Zona.
Cirsinus, s. Zona.
Cleghorn öffnet 100 am Todtenfieber gestorbene. III, 99.
Convulsio cerealis, s. Kribbelkrankheit.
Convulsionen der Kinder, neue Ursachen davon entdeckt. II, 48. 53.
Croup. II, 105.
Coqueluche, Antiquität davon. II, 126.
Crusta lactea. I, 45. 47.
— — scheint den Engländern fast unbekannt zu seyn. I, 45.
— — Mittel dagegen. I, 59.
— — ist nicht allein Krankheit der Säuglinge. I, 50.
— serpiginosa. I, 43.
— — wird oft mit Crusta lactea verwechselt. I, 47.
— — worin sie davon abweichet. I, 52.
— — Mittel dagegen. I, 58.

D.

D.

Darmcanal, Verengerung desselben. I, 100.
— — — gewöhnliche Ursache der Melancholie, und des Wahnsinns. I, 183.
Dentition als Ursache von versteckten Krankheiten der Kinder. II, 3.
— wird von vielen bezweifelt. II, 8.
— Zeichen derselben sind sehr trüglich. II, 21.
— Unglauben des Verf. dabey. II, 5.
Derby-neck, s. Kropf.
Dessault's Verdienste. III, 3. 8.
Diagnostik, was sie sey. I, 5.
— ist von Semiotik unterschieden. I, 6.
— ihre Nothwendigkeit. I, 9.
— — besonders bey Kinderkrankheiten. I, 23.
— ihr Nutzen bey Streitigkeiten der Aerzte. I, 20.
Dyspnoea. II, 148. 150.
Dysphagie, ihre verschiedene Ursachen. III, 163. 172.
— vom Krampfe. III, 182.
— vom paralysischen Zustande der Speiseröhre. III, 187.
— Heilung durch bittre Mittel.
Dysurie, ihre Ursachen schwer zu erkennen. III, 9.
— ist eine gewöhnliche Krankheit des Alters.
— ihre verschiedenen Ursachen. III, 17.
— ist in Demerary endemisch. III, 37.
Divinationsgabe wird nicht bloß durch Magnetismus hervorgebracht. I, 151.

E.

E.

Eisen, Berührung damit, wirkt wie das Magnetisiren. I, 159.
Ecrouelles, s. Scrofuln.
Elephanten, ihre merkwürdige Dentition. II, 97.
Elsner über die Entstehung der Pocken. I, 42.
— — — der Brustbräune. II, 163.
Epilepsie von Würmern. III, 85.
Ergot, was es sey. I, 157.
Erysipelas vesiculosum, pustulosum. I, 65.
Erbrechen, chronisches. I, 163.
— — wann es geschehn, genau zu untersuchen. I, 170.
— — Farbe des ausgebrochenen. I, 175.
— von großer Ausdehnung des Magens. I, 193.
— von Gallensteine, s. Gallensteine.
— von Krankheit der Nieren, s. Nieren.
— ist von Rumination unterschieden. III, 167.
Exanthematische Krankheiten, s. Ausschlagskrankheiten.

F.

Fall auf den Kopf verursacht oft Hirnwassersucht. III, 65.
Febris bullosa, I, 65.
— — vom Pemphigus unterschieden. I, 87.
— petechizans. I, 91.
— apoplectica soporosa. III, 47.
— — Aehnlichkeit mit der Hirnwassersucht. III, 92.

Febris apoplectica soporosa, Sectionen solcher Kranken. III, 98.
— — befällt auch Kinder. III, 100.
— — Unterschied von Hirnwassersucht. III, 105.
Feu volage, s. Zona.
Feuer, das höllische, s. Zona.
Fleckfieber, s. Petechien.
— eigentliches gibt es nicht. I, 102.
Fodere' vom Kropfe. I, 118.
La Fontaine vom Weichselzopfe beurtheilt. I, 38.
Franks Werk beurtheilt. I, 39.
Fothergill von Brustbräune. II, 217.
— glaubt, Hirnwassersucht und Wurmkrankheit verwechselt zu haben. III, 52. 71.
Fresser bekommen leicht eine gefährliche Ausdehnung Magens. I, 199. 204.
Frieselbläschens Zeichen des nahen Todes. III, 67.

G.

Gallenfieber, ist nicht immer da, wo Galle in den Magen kommt. I, 168.
Gallensteine, Zeichen davon. I, 186.
— Krankheit davon. Ebendas.
— erregen oft gar keine Beschwerde. Ebend.
Gallenfieber war einmal bey Aerzten, nicht bey Kranken epidemisch. I, 168.
Gautieri vom Kropfe. I, 125.
Generalisiren hilft in der Therapie nicht viel. I, 51.
Geuns heilet die Dysphagie auf eine besondere Art. III, 189.

Gicht

Gicht ist nicht Ursache von Brustbräune. II, 163.
Giftbaum, s. Rhus toxicodendron.
Glandula thyroidea, s. Schilddrüse.
Goître, s. Kropf.
Gotazze, s. Parotis.
Gruner über die Entstehung der Lustseuche. I, 42.
Gürtel, s. Zona.

H.

Hamilton von Scrofuln. I, 238.
Hageldrüsen. I, 136. S. Scrofuln.
Harris Theorie von Kinderkrankheiten aus Säure. I, 59.
Hautkrankheiten, ihre große Verwechselung. I, 33. 36.
Haygarth von Brustbräune. II, 227.
Helminthologie durch Deutsche aufgeklåret. III, 78.
Herzklopfen. II, 189. 191.
Hensler vom Aussatze. I, 39.
Heisters Meinung von Scrofuln und Kropfe. I, 111.
Heberden der erste von der Brustbräune. II, 143.
Hippocrates stärker in der Semiotik als Diagnostik. I, 7.
— von Zahnarbeit. II, 6.
Hives, s. Millars Asthma.
Hirnschädelsuturen, Ursache von Krankheiten. II, 89.
Hirnwassersucht dient den Aerzten oft zum Vorwande. III, 51.
— wird oft mit andern Krankheiten verwechselt. III, 50.

Hirnwassersucht, ihre Beschreibung. III, 57.
— ist hitziger und chronischer Art. III, 59. 70.
— Verwechselung mit Wurmkrankheit. III, 77.
— Unterschied davon. III, 88.
— ob sie zur Wassersucht oder Schlagfluß gehöre. III, 107.
Home vom Croup. II, 124. 167.
Hoden leiden bey Parotis. I, 174.
— sind bey Kinderkrankheiten oft Ursache von Convulsionen. II, 48.
Hofmeyer verwechselt Kribbelkrankheit mit Veitstanz. I, 143.
Hopfengärtners Beschreibung des Veitstanzes. I, 148.
Horst von einem goldenen Zahne. II, 51.
Hoffmann vom Herzpolypen. II, 188.
Humoralpathologie ist nicht zu verwerfen. I, 59. 61.
Hufelands Monographie von Scrofuln. I, 113.
Hurlok Monographie von Zahnarbeit. II, 15. 70. 74.
Hunters Monographie von Zähnen. II, 33.
— Krankheit beschrieben. II, 166.
— Urtheil über Wurmfieber. III, 75.
Hühnerweh. II, 125.
Hydrocephalus, s. Hirnwassersucht.
Hydrops cerebri, s. Hirnwassersucht.

J.

Ignis, s. Zona.
— S. Antonii. I, 69.

In-

Incontinenz des Urins bey alten Leuten. III, 12. Ihre Ursache, 13. Bey Frauenspersonen. III, 19.
— ist oft Folge der Retention. III, 25.
— von vergrößerter Prostata. III, 26.
Individualisiren, die Kunst des wahren Arztes. I, 11.
Jördens verwechselt Kribbelkrankheit mit Veitstanz. I, 142.
Johnston heilt die Dysphagie mit krampfstillenden Mitteln. III, 186.

K.

Kinderkrankheiten, dabey ist die Diagnostik vorzüglich nöthig. I, 17.
King's evil, s. Scrofuln.
— vom morbus regius unterschieden. I, 129.
Keichhusten, s. Coqueluche.
Knips Macoppe vom Herzpolypen. II, 190. 227.
Kortum von Scrofuln beurtheilt. I, 110.
Könige heilen den Kropf nicht mehr. I, 129.
Kohlnicker, s. Steinfresser.
Kopfpleuresie. II, 160.
Kopfkrankheiten sind selten idiopathisch. III, 97.
Koch's Monographie von Nesselsucht. III, 132.
Krebse, s. Astacus.
Kribbeln, was es sey. I, 154.
Kribbelkrankheit. I, 139.
— vom Veitstanze unterschieden. I, 151.
— war keine Wurmepidemie. III, 83.

Krankheiten, neue, den Alten wahrscheinlich auch schon bekannt. I, 17.
Krämpfe, unschickliche Benennung für Schmerzen. III, 35.
Krätze, artet nicht in einen andern Ausschlag aus. I, 41.
— Aehnlichkeit mit Nesselsucht. III, 127.
— Unterschied von Nesselsucht. III, 147.
— wie das Zurücktreiben zu erklären sey. III, 146.
— warum ihre specifischen Mittel oft nicht helfen. III, 149.
Kropf. I, 105.
— wird mit Scrofuln verwechselt. I, 112.
— Unterschied von Scrofuln. I, 115.
— dessen Extirpation. I, 113.
— — wahrscheinliche Ursache, mechanischer Art. I, 122.

L.

Lähmung der untern Extremitäten. III, 18.
Laurent Meinung über die Ursache des Tetanus III, 86.
Letsoms Geschichte einer Hirnwassersucht. III, 95.
Lieutaud leugnet die Herzpolypen. II, 189. 183.
Lodemann entdeckt eine Ursache von Convulsionen. II, 48.
— widerlegt Weikardt über die Hirnwassersucht. III, 54.
Loders Meinung vom Durchbruche der Zähne. II, 36.

Lorry

Lorry von Hautkrankheiten beurtheilet. I, 37.
Löwen, ihre angebliche schwere Dentition. II, 96.
Lumbrici effractores, eine pathologische Fabel. III, 84.

M.

Magen, Schwäche desselben ist nur selten Ursache des Erbrechens. I, 159.
— ungeheure Ausdehnung desselben. I, 193. 197. 201.
Magensaft, Säure desselben als Ursache von Krankheiten. I, 60.
Magenmund verhärtet. Zeichen davon. I, 174.
— — — Entstehung. I, 176.
— — — zu Zürich vorzüglich häufig. I, 178.
Magnetiseurs. Vorschlag an dieselben. I, 162.
Mal des rois, s. Scrofuln.
Masern. Aehnlichkeit mit Nesselfieber. III, 151. 154.
— Unterschied vom Nesselfieber. III, 156.
Mead Irrthum bey Scrofuln. I, 110.
— — vom Veitstanze. I, 147.
Melancholie, gewöhnliche Ursache derselben. I, 182.
Milchborke, s. crusta lactea.
— woher die Benennung. I, 49.
Millars Asthma wird oft verkannt. II, 102.
— — Beschreibung desselben. II, 115.
— — Unterschied von der häutigen Bräune. II, 130.
— — specifisches Mittel dagegen. II, 121.
Miasma artet nicht aus. I, 41.

Mi=

Michaelis Monographie von der häutigen Bräune. II, 108.
Menstrua, Mittel wider die Schmerzen dabey. III, 114.
Mortalität in den ersten Jahren des Lebens, woher sie entstehe. I, 24. II, 12. 14.
Monro, ob die Zähne ein Periosteum durchbohren. II, 37.
Morgagni hat schon die Brustbräune beschrieben. II, 159.
— hält die Herzpolypen für selten. II, 185.
— hat die mehrsten pathologischen Sectionen gemacht. III, 8.
Morbus maculosus haemorrh. Werlhofii. I, 91.
— ist von Petechien unterschieden. I, 98.
— complicirt mit andern wird gefährlich. I, 104.
Muscheln, s. Mytilus.
Mumps. I, 106.
Mytilus edulis. Die von dem Genusse entstehende Krankheit. III, 139.
— — enthält nicht selbst ein Gift. III, 141.

N.

Nemnichs nosolog. polyglotten Lexicon beurtheilt. III, 126.
Nesselsucht, Nesselfieber. III, 121. 132.
— Aehnlichkeit mit Krätze und Masern. III, 144.
— Verwechselung mit andern Ausschlagskrankheiten. III, 130.

Nesselsucht, vieljährige Fortdauer derselben. III, 136.
— ist keine locale Hautkrankheit. III, 142.
— Sonderbarkeiten derselben. Ebendas.
— ist nicht ansteckend. III, 148.
Nieren ganz zerstört ohne Zeichen. III, 6.
— enthalten oft den Grund eines Erbrechens. I, 187.
— Zeichen davon. I, 188.

O.

Oreillons, s. Parotis.
Ourles, s. Parotis.
Orechioni, s. Parotis.
Onanie von Würmern erregt. III, 81.
Oesophagus, s. Speiseröhre.

P.

Pancreas ist oft Ursache des chronischen Erbrechens. I, 206.
— Verhärtung oder Vergrößerung. I, 207.
— Ursache eines langwierigen Speichelflusses. I, 208.
Parotis, Beschreibung dieser Krankheit. I, 105. 131.
— ist epidemisch. I, 133.
Pare' macht zuerst einen Einschnitt in das Zahnfleisch. II, 73.
Parry von der Brustbräune. II, 174. 173.
Pasta leugnet den Herzpolypen. II, 206.

Patin's Krankheit. II, 228.
Petechien. I, 91.
Pemphigus. I, 65.
— vom Gürtel unterschieden. I, 83.
— von febris bullosa unterschieden. I, 87.
Pathologie in den neuern Zeiten gereinigt. II, 7.
— die belebte aufgeklärt. III, 78.
Periosteum, ob es den Zahn bedecke. II, 35.
Petraglia vom Herzpolypen. II, 218.
Pfuscherey, was sie sey. I, 9.
Platner widerräth den Einschnitt im Zahnfleische. II, 77.
Polypus cordis. II, 178.
— Zeichen desselben. II, 189.
— falscher und ächter. II, 182.
— in den Bronchien. II, 139.
— im sichelförmigen Sinus. III, 112.
Prosser vom Bronchocele beurtheilt. I, 109.
Prostata, ihre Vergrößerung als Ursache der Dysurie. III, 20.
— Zeichen dieser Art Dysurie. III, 22. 27.
Pulvis ad Strumas, dessen alter Gebrauch. I, 130.
Puls, seine Irregularität als Zeichen. II, 192.
— ungewöhnlich langsam bey der Hirnwassersucht. III, 63.
Pharyngocele, s. Dysphagie.

Q.

Quecksilber, dessen Wirkung bey der Hirnwassersucht. III, 118.
— — — Dysphagie. III, 179.
ist eine Entdeckung der Engländer. Ebend.

R.

Rahns Beschreibung der Verhärtungen im Magen. I, 178. 200.
Raccornissement des Magens. I, 173.
— der Blase. III, 10. 14.
Raphania, s. Kribbelkrankheit.
Rhus toxicodendron. Krankheit davon. I, 65. 76.
— — ist vielen Thieren ganz unschädlich. I, 83.
Röderers morbus mucosus war keine Wurmepidemie. III, 83.
Rötheln, schwankender Begriff davon. III, 152.
Rumination, s. Wiederkäuen.
Rush über das Asthma der Kinder. II, 109.
— Geschichte eines Säufers. I, 172.
— Meinung von der Hirnwassersucht. III, 109.
— glaubt, Kinder werden krank, weil sie keine Würmer haben. III, 74.

S.

Sägesprünge, s. Crusta lactea.
Säufer bekommen Verhärtungen des Pylorus. I, 199.
Säure, ob daraus Krankheiten entstehen. I, 69.
Scorbut, irrige Benennung. I, 100.
Scelotyrbe, s. Chorea S. Viti.
Semiotik ist von Diagnostik unterschieden. I, 6.
Schilddrüse, ihr Unterschied von andern. I, 117.
— ihre Krankheit. I, 105.
— ihre Structur. I, 128.

Schielen u. Gähnen haben etwas ansteckendes. I, 152.
Schlafsüchtiger Zustand der Kinder nicht von Dentition. II, 67.
Senac Meinung vom Herzpolypen. II, 184. 208.
Schlingen, Hinderniß desselben, s. Dysphagie.
Schneewasser ist nicht Ursache vom Kropfe. I, 123.
Schmerzen der Kinder, ihr Sitz sehr ungewiß. II, 48.
Scrofuln. I, 105.
— Unterschied vom Kropfe. I, 115.
Scrofula fugax. I, 105.
Schwamm gebrannt, wider den Kropf. I, 130.
Schwäche ist nicht immer Ursache, sondern oft Folge einer Krankheit. I, 190.
— wird oft durch schwächende Mittel gehoben. Ebendaselbst.
Shingles, s. Zona.
Spanische Fliegen, Ausschlag davon. I, 80.
Struma. I, 105.
Steinfresser Kohlnicker. Dessen Section. I, 200.
Speichelfluß v. verhärteter Bauchspeicheldrüse. I, 208.
— bey Kindern, ob er von Dentition entstehe. II, 48.
Sömmerring Urtheil vom Durchbruche der Zähne. II, 36.
Smyth. II, 147.
Speiseröhre, verengert, verhärtet. III, 169.
Suffocatio Stridula, s. Bräune.
van Swieten widerräth den Einschnitt am Zahnfleische. II, 77.

T.

Taenia, s. Bandwurm.
— hydatigena im Gehirn. III, 69.
Taxil von Convulsionen der Kinder. II, 13.
Tetanus, s. Trismus.
Thomann vom Herzpolypen. II, 209.
Thickening of the coats des Magens. I, 173.
— — — der Urinblase. III, 10. 14.
Todtenfieber, s. febris apoplectica soporosa.
Torti vom Todtenfieber. III, 102.
Trismus maxillae bey Kindern. II, 92.
— traumaticus, woher er entstehe. III, 86.
Tripper, Unterschied vom venerischen Uebel. III, 33.
— legt oft den Grund zur Dysurie im Alter. III, 32.
— bey Kindern. II, 57.
Trichuriden erregen keine Epidemie. III, 83.

U.

Underwood von Dentition. II, 79.
Urinblase, ihre Häute verdickt. III, 10. 14. Die Folgen davon. III, 17.
— von ungeheurer Größe. III, 16.
— ihre Paralysis ist nicht allein Ursache der Incontinenz. III, 34.
Urinverhalten bey Kindern, die Ursache. II, 65.
Urticatio, s. Nesselsucht.

V.

Venerisches Gift, artet nicht aus. I, 41.
— — Unterschied vom Trippergifte. III, 3.
Veitstanz, s. Chorea S. Viti.
Verdauung, geschwächte, erfordert nicht immer stärkende Mittel. I, 190.
Verdauungssäfte, ihre Säure als Ursache von Krankheiten. I, 62.
Verdickung der Häute des menschl. Körpers. III, 17.
— — — der Urinblase. III, 18.
— — — des Oesophagus. III, 169.
Verknöcherung der Milzader. II, 177.
— der Kranzadern des Herzens. II, 173.
Vermitio, s. Wurmkrankheit.

W.

Wagler beschreibt die Brustbräune. II, 174.
— heilet eine Dysphagie mit Sublimat. III, 181.
Wasserkopf, s. Hirnwassersucht.
Wahnsinn, eine Ursache davon. I, 183.
Werlhof macht zuerst auf morbus maculosus haem. aufmerksam. I, 98.
Weber's Monographie von Scrofuln. I, 109.
Watson will die Hirnwassersucht auch bey Erwachsenen beobachtet haben. III, 58.
Whyte on Struma beurtheilt. I, 109.
R. Whytt macht sich um die Hirnwassersucht verdient. III, 56.

Weikard leugnet die Hirnwassersucht. III, 52.
— sein Urtheil über einen Gedanken des Verf. I, 204.
Wedekind. II, 76. 83.
— beschreibt die Masern am genauesten. III, 155.
Wilmer von Scrofuln. I, 109.
Willan von Hautkrankheiten beurtheilt. I, 39.
Wisemann verwechselt Kropf mit Scrofuln. I, 109.
Widerkäuen, Ursache davon. III, 167.
Würmer verdienen Toleranz. III, 75.
— ihre Unschuld erwiesen. III, 78.
Wurmkrankheit. III, 47.
— gibt es nicht. III, 72. 82.
Wurmepidemieen, was davon zu halten sey. III, 82.
Wurmschleim wünscht der Verf. kennen zu lernen. III, 86.

Z.

Zahnen der Kinder, s. Dentitio.
Zahnfieber. II, 69.
Zahnruhr, was es sey. II, 61.
— findet sich auch bey Erwachsenen. II, 63.
Zahnfleisch, Spannung desselben, ob sie existire. II, 30.
— ob es unempfindlich sey. II, 32. 38.
— Einschnitt in dasselbe. II, 72. 78.
— oben ist von dem an der Seite unterschieden. II, 75.
Zähne, warum sie nach dem Tode hervorkommen. II, 81.

Zähne, ob ihr Durchbruch schmerzhaft sey. II, 26.
— schon vor der Geburt gewachsene. II, 29.
Zimmermann heilet eine Dysphagie mit krampfstillenden Mitteln. III, 186.
Zoster, s. Zona.
Zona. I, 65.
— gehört nicht unter Erysipelas. I, 69.
— — mehr unter Herpes. I, 71.
— Werlhofs Heilart desselben. I, 74.
— sonderbarer Eigensinn, immer auf eine Seite sich einzuschränken. I, 74.

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Wichmann, Johann Ernst,

Ideen zur Diagnostik beobachtenden Aerzten mitgetheilet

Bd.: 3

1802

Bamberg, Staatsbibliothek -- M.o.101#3
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11738029-5
VD18 15537552-ddd